

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)

Superfamilia: *Hesperioidea*

Familia: *Hesperiidae*

Subfamilia: *Hesperiinae*

Tribu: *Heteropterini*

Género: *Carterocephalus* Lederer, 1852

Status: Rara.

Planta nutricia: Gramíneas, tales como *Brachypodium sylvaticum* y probablemente *Bromus mollis* y *Cynosurus cristatus*, estando citada también de plantagináceas del género *Plantago*.

Distribución: Solamente se han localizado, en la parte septentrional de España, tres colonias, todas ellas de pequeña densidad: Valle de Arán (Lérida), Peña de Orduña (Vizcaya) y cercanías de Oviedo (Asturias). Se ha descrito de la Peña de Orduña la subespecie *sarahe*, quizá ya extinguida, teniéndose en cuenta que su área de vuelo era un prado de 10 x 10 m.

Hábitat: Su área preferente de vuelo es siempre por encima de los 500 m., volando a lo largo de las laderas suaves cubiertas de hierba, buscando siempre la protección de zarzamoras, hortigales, etcétera.

Ciclo biológico: Inverna como larva y vuela durante junio y julio en una sola generación.

Recomendaciones: Protección máxima de este endemismo subespecífico ibérico, intensificándose labores de campo para localizar otras colonias aisladas, que seguramente existen.