

Erebia alberganus (Prunner, 1798)

Superfamilia: *Nymphaloidea*

Familia: *Satyridae*

Subfamilia: *Satyrinae*

Tribu: *Erebiini*

Género: *Erebia* Dalman, 1816

Status: En peligro de extinción (considerada antes endemismo).

Planta nutricia: *Poa annua*, *P. trivialis*, *Festuca ovina*, *F. rubra*, *F. elatior* y otras gramíneas herbáceas.

Distribución: Cercanías de Reinosa, en la vertiente del Pico Tres Mares (a 1.000 m.) y Breña Vieja, Cantabria. La colonia, única conocida en la Península Ibérica, fue separada como subespecie *barcoi*.

Hábitat: Espacios abiertos cubiertos, de hierba, principalmente entre los 1.000 y 1.200 metros de altitud.

Ciclo biológico: Una sola generación, cuyo desarrollo es totalmente desconocido en lo que respecta a la raza española, excepto en cuanto a su época de vuelo, que lo es la segunda mitad de junio y la primera de julio. Probablemente inverne como oruga, como hace en otros lugares de Europa.

Recomendaciones: Al no haberse vuelto a capturar en los últimos diez años, pudiera considerarse ya como especie extinguida, pero por el momento preferimos mantenerla entre el grupo de taxones en peligro de extinción, que deben recibir la más alta protección de aficionados y autoridades.