

Maculinea teleius (Bergstrasser, 1779) (= *euphemus* Hubner y *telegonus* Bgst.)

Superfamilia: *Lycaenoidea*

Familia: *Lycaenidae*

Subfamilia: *Polyommatae*

Tribu: *Glaucopsychini*

Género: *Maculinea* Van Ecke, 1915

Status: Rara.

Planta nutricia: Las larvas jóvenes comen *Sanguisorba officinalis*. Durante el resto de su vida larvaria son alimentadas por *Myrmica scabrinodis* con sus propias larvas.

Distribución: Conocida solamente de dos enclaves pirenaicos, uno en el Valle de Arán (Lérida), su localidad clásica española, y más recientemente de Setcasas (Gerona).

Hábitat: Biotopos de humedad extremada no superiores a los 2.000 m. de altitud, necesitando asociarse simbióticamente con hormigas del género *Myrmica*, durante sus mudas. De no existir colonias de estos formícidos, la mariposa desaparece.

Ciclo biológico: Vuela en una corta generación durante el mes de julio, después de haber invernado como larva dentro de un hormiguero a donde ha sido transportada y alimentada por hormigas de la especie *Myrmica scabrinodis*, que la han atendido durante su crecimiento sobre la planta nutricia en otoño; crisalidando en primavera dentro del hormiguero y buscando por sus propios medios la salida, ya como adulto, durante julio.

Recomendación

Dada su rareza y escasez, puede haber pasado ya otra categoría

más cercana a su extinción, por lo que debe protegerse al máximo este taxón y estudiar su bionomía para proponer medidas urgentes.