

Ocnogyna zoraida (Graslin, 1833)

Superfamilia: *Noctuoidea*

Familia: *Arctiidae*

Subfamilia: *Micrarctiinae*

Género: *Ocnogyna* Lederer, 1851

Status: Endemismo.

Planta nutricia: Prefiere las hojas de *Plantago lanceolata* y de *Sca biosa* sp.

Distribución: Ocupa una amplia área central, meridional y oriental de la Península Ibérica, con enclaves en Burgos, Logroño, Navarra y reaparición en Cataluña y Norte de, Huesca, superando la frontera y entrando en territorio francés.

Hábitat: Zonas abiertas y protegidas del viento, entre los 400 y los 1.800 metros

de altitud, en donde los machos pueden volar con libertad en busca de las hembra posadas en el suelo o en las ramas bajas.

Ciclo biológico: Vuela durante mayo y junio y en el Norte hasta agosto, siendo atraídos los machos por la luz artificial y por las hembras, braquípteras en mayor o menor grado, actividad sexual lo mismo diurna que nocturna; invernando como crisálida envuelta en un capullo sedoso enterrado al pie de su planta nutricia.

Recomendaciones: Se trata de una de las rarezas mayores de la fauna ibérica, con

colonias muy diseminadas pero débiles, habiéndose separado la raza francesa como subespecie *hemigena*, que sustituiría a la tiponominal en el Norte de España (algunos autores la consideran especie distinta), aunque en realidad hay ejemplos de ésta última en el interior peninsular; debe protegerse el taxón en máximo grado, continuando el estudio de su bionomía y distribución geográfica.