

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)

Superfamilia: *Papilionoidea*

Familia: *Papilionidae*

Subfamilia: *Zerynthiinae*

Tribu: *Zerynthiini*

Género: *Zerynthia* Ochsenheimer, 1816

Status: En peligro de extinción (dos subespecies).

Planta nutricia: *Aristolochia longa*, *A. rotunda*, *A. pistolochia* y otras Rizocárpicas del propio género.

Distribución: Ampliamente establecida por la Península Ibérica, excepto en el litoral cantábrico, parte del País Vasco y Galicia, donde sólo mantiene colonias aisladas.

Hábitat: Preferencia hacia biotopos de monte bajo, pedregosos, llanos o suavemente ondulados, desde el nivel del mar hasta los 1.000 m. de altitud.

Ciclo biológico: Una sola generación de vuelo durante febrero/mayo (en el Sur) y mayo (en el Centro y Norte), hibernando como crisálida aérea.

Recomendaciones: Aunque no corre peligro en la mayor parte de su territorio de vuelo, hay dos subespecies, endémicas, que están cercanas a su extinción de no tomarse medidas protectoras inmediatas. Una de ellas es *cantabricae* Gómez-Bustillo (entre el Suroeste de Santander, Palencia y Burgos) y la otra, *minima* Gerhandinger (El Regajal, Aranjuez-Madrid), considerada ésta como el Papiliónido de menor envergadura de todos los conocidos del mundo. Debe reservarse y protegerse las áreas de vuelo de las mismas, y se considera necesario llevar a cabo estudios de los requerimientos ecológicos de la especie (véase Heath, 1981; Viedma, 1984).