



## 1. INTRODUCCION por SANTIAGO PALAZON Y JORDI RUIZ-OLMO

### 1.1. ANTECEDENTES

El visón americano (*Mustela vison*, Schreber, 1777) es un mustélido semiacuático de tamaño medio, propio de la región Neártica, cuya distribución natural se extiende por el Este y Centro de Estados Unidos y Canadá, a excepción del Círculo Polar Ártico (PALMER, 1954; CORBET, 1980; DUNSTONE, 1993).

Debido a su apreciada piel fue muy trampeado desde muy temprano. Su elevado valor económico y la dependencia de las fluctuaciones naturales de su número y la eficiencia de su trampeo, condujeron a que se iniciase su cría en cautividad en Norteamérica, ya a finales del siglo pasado.

### 1.2. EL VISON AMERICANO EN EUROPA

Siguiendo esta tendencia, hacia los años 20 se comenzaron a instalar las primeras granjas de cría en varios países europeos: Suecia (1925), Francia (1926), U.R.S.S. (1928), Gran Bretaña (1929), Noruega y Finlandia (finales década 1920), Islandia (1930) y Dinamarca (1940) (MAIZERET, 1990; DUNSTONE, 1993). Este fue el punto de partida para que se convirtiese en una especie silvestre en nuestro continente. Muchos visones han ido escapando de estas granjas a lo largo del tiempo; además, en determinados países con una importante tradición peletera, los visones fueron liberados deliberadamente para constituir poblaciones salvajes. Este es el caso de la antigua U.R.S.S.; durante 30 años (1933-1962) se soltaron más de 16.000 ejemplares en 200 puntos diferentes de varias repúblicas soviéticas (ALIEV & SANDERSON, 1970).

Progresivamente, se han ido formando poblaciones estables en los ecosistemas acuáticos de numerosos países europeos (GERELL, 1971; MAIZERET, 1990; DUNSTONE, 1993). De esta forma el visón americano se halla extendido en la casi totalidad de Islandia, Irlanda, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Gran Bretaña y en algunas zonas de Francia, Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia y España (VIDAL-FIGUEROA & DELIBES, 1987; RUIZ-OLMO, 1987; BRAVO & BUENO, 1992; MUNILLA, ROMERO y GIMENEZ DE AZCARATE, 1992) (ver Fig. 1)

**FIG. 1.** Distribución originaria y actual del visón americano en el Mundo.

*Former and present distribution of American mink in the world.*

En España, las primeras granjas se instalaron en Segovia (1958) y Pontevedra (1959), y, posteriormente (década de los 70) en las restantes provincias de Galicia, centro de España (Ávila) y Cataluña (Barcelona y Girona). Más recientemente se han instalado granjas en otras Comunidades Autónomas: Navarra, Euskadi, Cantabria, Aragón (Teruel y Zaragoza) y Valencia (Castellón).

Teniendo como origen principal fugas masivas o continuadas, se han ido formando poblaciones estables de visón americano repartidas a lo largo de numerosos puntos de España. La primera cita como especie salvaje en la Península se debe a DELIBES y AMORES (1978). Según la bibliografía, hacia finales de la década de los 80 existían tres núcleos poblaciones en Galicia, Cataluña y Centro de España (VIDAL-FIGUEROA & DELIBES, 1987; RUIZ-OLMO, 1987; BUENO & BRAVO, 1990; PALAZON & RUIZ-OLMO, 1992).