



7. EL VISON AMERICANO EN ARAGON, por GLORIA JORDAN

La existencia de poblaciones asilvestradas de visón americano *M. vison*, en Aragón es muy reciente y se asocia al mes de julio de 1990, cuando una explotación de visones denominada Zovimar. S.A y ubicada en Sarrión (Teruel), entró en quiebra financiera, abandonándose el mantenimiento de las instalaciones que albergaban en aquel momento unos 8.000 visones (2.500 hembras de cría, 350 machos reproductores y más de 5.000 jóvenes del año). A pesar de la alta mortalidad detectada por inanición y canibalismo, se tiene constancia de que un número elevado de visones consiguieron huir de sus jaulas accediendo fácilmente al medio exterior.

Los resultados obtenidos demuestran que en el verano de 1991, justo un año después de la quiebra de la granja Zovimar, el visón americano había colonizado la mayor parte de los cursos fluviales existentes (90 km de río de los 160 prospectados), estando presente en un total de 8 cuadrículas U.T.M. (10x10 km²), es decir, unos 800 km².

La colonización extremadamente rápida efectuada por este pequeño mustélido se puede deber a varios hechos: 1) al elevado número de ejemplares liberados; 2) a que en el área estudiada el visón no encuentra competidores (dado que el turón, *Mustela putorius*, está ausente o es muy escaso y la nutria, *Lutra lutra*, mantiene una situación sumamente crítica (LACOMBA Y JIMENEZ, 1990) y 3) la presencia de «La Escaleruela», una piscifactoría situada en la confluencia del río Mijares con el río Albentosa, muy próxima al lugar de la liberación. Los ejemplares, que posiblemente llegaron hasta el río en penosas condiciones físicas a causa de la desnutrición y el agotamiento, pudieron establecerse allí e iniciar un proceso de recuperación. Se tiene constancia de que grupos de visones se instalaron tras la fuga, durante más de un mes, en la explotación piscícola. A partir de este punto los ejemplares una vez recuperados se dispersaron.

Actualmente, *M. vison* ocupa la totalidad del río Mijares en su lado turolense, con la excepción del curso alto que dio resultados negativos hasta el término de Formiche Bajo. A partir de este punto donde se determinó por primera vez su presencia, el visón fue detectado a lo largo de todo el río Mijares hasta el límite provincial con Castellón, donde finalizaron los muestreos. En el tramo limítrofe entre ambas provincias los rastros eran muy abundantes, por lo que se consideró muy probable su entrada en la Comunidad Valenciana, presencia que durante 1992 ya ha sido confirmada en la misma (Juan Jiménez, com. pers.).

El acceso del visón a los tributarios del río Mijares se ha realizado a través de las confluencias con este último, hallándose en el Albentosa, Alcalá (tramo inferior), Palomarejos y Morrón. Sólo en dos de los ríos prospectados el visón no estaba presente: Rubielos, aunque existen datos que sitúan a este pequeño mustélido en el río Mijares a menos de 1 km de la confluencia entre ambos, y en el río Linares. Su confluencia con el río Mijares se produce en Castellón a más de 25 km del límite provincial por lo que la colonización será más tardía.

Todos los datos obtenidos apuntan a que los ejemplares escapados se han adaptado perfectamente a las condiciones que impone la vida silvestre. Un año después de la fuga se obtuvieron cinco referencias que constatan la reproducción de la especie en libertad en varios lugares del área de estudio, aunque no se pudo estimar si se trataba de cinco reproducciones diferentes.