

## *Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766)

Castellano: Canastera

Catalán: Perdiú de mar

Gallego: Anduriña do mar

Vasco: Pratinkola

### **CATEGORIA DE AMENAZA**

ESPAÑA: VULNERABLE

CE: VULNERABLE

MUNDO: NO AMENAZADA

### **DISTRIBUCION**

ESPAÑA: Se distribuye de forma dispersa por el centro y sur, Las 43 localidades de cría conocidas se reparten entre Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Valencia y Cataluña (1).

CE: Restringida a los países de la cuenca mediterránea y Portugal. Las colonias de cría se encuentran muy dispersas, En Grecia se conocen tres colonias. En Italia cría regularmente en dos zonas de la costa adriática (Valle de Comacchio y Manfredonia) y, de forma esporádica, en Sicilia. En Francia sólo lo hace en la Camarga. En Portugal se distribuye por el centro y el sur del país.

MUNDO: Las poblaciones europeas del norte de Africa representan el límite occidental del área de distribución, que llega hasta Kazajistán, Irán y Pakistán. Al sur del Sahara se encuentran representadas dos subespecies distintas (2).

### **HABITAT**

Las colonias de cría se encuentran en zonas llanas desprovistas de vegetación y con una gran parte del suelo desnudo. Con frecuencia se trata de marismas y zonas similares próximas a masas de agua, aunque también en eriales, estepas y campos de labor alejados de ellas. Los cambios de ubicación de la colonia son frecuentes (2)

### **POBLACION**

ESPAÑA: En 1990 la población se estimó en 3.700-3.800 parejas, gran parte de las cuales se encuentran en las Marismas del Guadalquivir (aprox. 3.000 parejas). En Extremadura nidifican unas 500 parejas. Los restantes núcleos son muy reducidos, y probablemente se encuentren en regresión. (1)

CE: Muy escasa. La población de Grecia, constituida por unas 500 parejas, es la más importante fuera de la península Ibérica. En Francia su número oscila entre 20 y 50 parejas según los años. En Italia crían 10-30 parejas en Manfredonia y sólo dos o tres en Comacchio y Sicilia (2,3,4).

MUNDO: Gran parte de la población se encuentra en la antigua Unión Soviética. En el este de Europa (Hungría, la antigua Yugoslavia) es muy escasa y está en regresión (2).

### **AMENAZAS**

Las colonias españolas están amenazadas por el uso de pesticidas. En las Marismas del Guadalquivir, por los pesticidas y herbicidas utilizados en las zonas de cultivo. En La Serena (Badajoz), por las fumigaciones contra la langosta, que se realizan en plena época de reproducción.

## **MEDIDAS DE CONSERVACION**

Restricción del uso de insecticidas en la zona de influencia de las colonias. Campañas de divulgación entre los agricultores para evitar la destrucción de las colonias por el laboreo de los campos. Seguimiento de la población.

## **REFERENCIAS**

1. Martínez, A. (1991): "Primer censo de Limícolas coloniales y Pagaza piconegra". *Ecología*, 5: 321-328
2. Cramp, S., y Simmons K.E.L. (1983): *The Birds of the Western Palearctic*. Vol III. Oxford University Press, Oxford.
3. Mascara, R. (1987): "Accertate nidificazione di pernice di mare. Glareola praticola in un area cerealicola della Sicilia". *Riv. Ital. Orn.* 57: 1-37
4. Piersma, T. de. (1986: *Breeding waders in Europe*". *Wader Study Group Bull.*, 48 Supl.: 1-116.