

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Castellano: Cigüeña negra

Catalán: Ciconya negra

Gallego: Cigoña negra

Vasco: Amiamoko beltza

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: EN PELIGRO

CE: EN PELIGRO

MUNDO: NO AMENAZADA

DISTRIBUCION

ESPAÑA: Se han localizado parejas reproductoras en sólo cuatro Comunidades

Autónomas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León. En Andalucía ocupa las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén a lo largo de las estribaciones de Sierra Morena. En Castilla-La Mancha existen dos núcleos, uno al noroeste de la provincia de Toledo y otro en la mitad occidental de Ciudad Real. En Castilla y León existe un importante núcleo en los Arribes del Duero (Esla, Tormes, Huebra y Agueda) (Zamora y Salamanca) y otro en la zona sur de la Comunidad, en las provincias de Avila y Segovia. En Extremadura destaca el núcleo que se asienta a lo largo de toda el área de influencia del río Tajo y sus afluentes (1). Un pequeño número de individuos permanece durante el invierno en puntos favorables del centro y sur de la Península (2).

CE: Nidifica en la Península Ibérica, Francia, Bélgica, Alemania, Grecia y Luxemburgo (3, 4). En Portugal se encuentra en lugares muy concretos de los valles de los ríos Duero, Tajo, Guadiana y sus afluentes a lo largo de la frontera con España (5). En Francia, en Franche-Comté y Aujon (6). En Bélgica, en la comarca de Wallonie

(7). En Alemania, en la Baja Sajonia y Baviera (3, 4).

MUNDO: Cría desde la Europa central y oriental hasta Asia septentrional (Mongolia y China); hacia el sureste, en Turquía, Próximo Oriente e Irán. En el sur de Africa existe una población aislada (3).

HABITAT

En España ocupa, en general, zonas de influencia mediterránea muy poco transitadas, instalando sus nidos en cantiles, viejas encinas o alcornoques (*Quercus* spp.), o en repoblaciones de coníferas (*Pinus* spp.) cercanos a cursos fluviales, embalses o lagunas. De 123 nidos controlados durante 1987, el 60,9% se situaron en roca (1), aunque dentro de su área de distribución mundial es más frecuente la nidificación en árbol (3). Una pequeña parte de la población inverna en España. Es una especie muy sensible a las molestias.

POBLACION

ESPAÑA: En 1987 se llevó a cabo el primer censo nacional de la especie, estimándose el tamaño de la población en 175 parejas reproductoras. Más de la mitad de ellas (58%) se encuentran en Extremadura, el 22,4% en Castilla y León, el 10,3% en Castilla-La Mancha y el 9,3% en Andalucía. Las zonas de mayor densidad se localizan en los Arribes del Duero (Salamanca y Zamora), la cuenca del Tajo en Cáceres y el valle del Tiétar (Avila) (1). Comparando estos datos con estimas anteriores parece que la población se encuentra estabilizado.

CE: El 70% de la población se localiza en la Península Ibérica. Después de España, los mayores núcleos están en Portugal (40-60 parejas en 1989) y Alemania (45 parejas). Otros países con poblaciones menores son Grecia (20 parejas), Francia (12 en 1988), Bélgica (4-5 en 1989) y Luxemburgo (1-3 en 1989). En Dinamarca se extinguió en 1951. La tendencia parece creciente.

MUNDO: Desconocida.

AMENAZAS

En España las amenazas más importantes son la transformación y las molestias en sus hábitats de cría, alimentación y concentración pre y postnupcial. De 43 casos de muerte no natural conocidos entre 1980 y 1987, el 62,8% correspondieron a caza ilegal; el 13,9%, a pérdidas en el nido causadas por molestias; el 13,9%, a expolios; el 4,6%, a choques con tendidos eléctricos, y el 4,6%, a otras causas (1). Las mismas amenazas han sido señaladas para otras poblaciones de la CE (4).

MEDIDAS DE CONSERVACION

Dado que es una especie muy sensible a la alteración del hábitat y a las molestias, es fundamental dictar normas estrictas de protección de las zonas de cría, alimentación, concentración e invernada. Además, es conveniente el seguimiento de la especie (1,4,8).

REFERENCIAS

- 1 . González, J. L. (1 987): *Inventario de la población española de Cigüeña negra (Ciconia nigra)*. ICONA. Informe inédito. Madrid.
2. San Segundo, C. (1 991): *Selección de hábitat del género Ciconia en España. Areas de invernada de la Cigüeña negra*. Convenio CSIC-ICONA. Informe inédito.
3. Cramp, S., y Simmons K. E. L. (1 977): *The Birds of the Western Palearctic*. Vol.I Oxford University Press. Oxford.
4. Anónimo (1990): *Fiches d'information sur les espèces énumérées dans l'annexe I de la Directive 79/409/CEE*. Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Informe inédito.
5. Rufino, R. (1989): *Atlas das Aves que nidificam em Portugal continental*. CEMPA. Lisboa.
6. Loiseau, A. J. (1977): "Nidification de la Cigogne noire (*Ciconia nigra*) en Franche-Comté: première donnée française,". *Alauda*, 45: 335-338.
7. Pierre, P. (1988): "Statut actuel de la Cigogne noire (*Ciconia nigra*) en Wallonie". *Aves*, 25 (3/4): 183-189.
8. ICONA (1 986): *Lista Roja de los Vertebrados de España*. MAPA, Madrid.