



Saxicola dacotiae (Meade-Waldo, 1889)

Castellano: Tarabilla canaria

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: *S. d. dacotiae*, RARA

S. d. murielae, EXTINGUIDA

ENDEMISMO ESPAÑOL

DISTRIBUCION

La subespecie *S. d. dacotiae* nidifica únicamente en Fuerteventura, de donde es endémica. A principios del siglo XX otra subespecie (*S. d. murielae*) se sospechaba que criaba en Montaña Clara y Alegranza (Lanzarote) (1, 2), pero se considera extinguida en la actualidad.

HABITAT

La subespecie, nominal de Fuerteventura, se localiza en laderas pedregosas, malpaíses con abundante vegetación y cauces de barrancos con bosquetes de *Tamarix*. A veces también en cultivos.

POBLACION

La población de *S. d. dacotiae* de Fuerteventura, aunque ampliamente distribuida por toda la isla, presenta un área discontinuo. Sus efectivos se han estimado en unas 750 parejas (más/menos 100) (3).

AMENAZAS

La principal amenaza es la desertización, provocada fundamentalmente por el sobrepastoreo. En años secos podría verse afectada por escasez de recursos tróficos y la desecación de los cursos de agua de los barrancos (3).

MEDIDAS DE CONSERVACION

Protección de hábitat mediante una gestión adecuada contra la desertización; control, de la presencia de cabras en las zonas protegidas.

REFERENCIAS

1. Collar, N. J., y Stuart, S. N.(1985): *Threatened Birds africa and related islands*. ICBP & IUCN, Cambridge.
2. Martín, A.; Hernández, E.; Nogales, N.; Quilis, V.; Trujillo, O., y Delgado, G. (1 990): *El Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Canarias*. Caja General de Ahorros de Canarias, Santa Cruz de Tenerife.
3. Phillips, B. N. (1986): "The Fuerteventura Stonechat Project". *ICBP Study Report*, 8, 30 pp.