






51 MATORRALES SUBMEDITERRÁNEOS Y DE ZONA TEMPLADA

5130 Formaciones de *Juniperus communis* en brezales o pastizales calcáreos


Formaciones arbustivas de enebro común¹ (Juniperus communis), que colonizan matorrales o pastizales de media montaña.


 Las formaciones arbustivas de enebro común adscritas a este tipo de hábitat han sido únicamente reconocidas como tales en la región biogeográfica alpina de los Pirineos catalanes.

 Estas formaciones prosperan, generalmente constituyendo mosaicos, sobre **pastizales²** mesófilos o xerófilos pastoreados o en proceso de abandono, y menos frecuentemente sobre matorrales de brechina o escobonales. Se desarrollan sobre todo tipo de sustratos, en general ocupando las vertientes más frescas.

 Se trata de formaciones arbustivas de estructura abierta dominadas por el enebro común, al que pueden acompañar *Calluna vulgaris*, *Cytisus scoparius* o *Pteridium aquilinum* en las situaciones de suelos más o

menos ácidos, o bien distintas especies de pastos basófilos en los sustratos calcáreos.

 La fauna es la típica de las formaciones de otros matorrales de media montaña. Véase lo comentado en 5210.



Enebro común (*Juniperus communis*)

