






## 21 DUNAS MARÍTIMAS DE LAS COSTAS ATLÁNTICAS, DEL MAR DEL NORTE Y DEL BÁLTICO

### 2130 Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) (\*)

*Dunas terciarias o grises de las costas atlánticas, con sustratos fijos o semifijos, colonizadas por herbáceas y pequeños arbustos resistentes a la influencia del viento marino.*

 Tipo de hábitat presente en las costas arenosas del litoral atlántico, desde el Cantábrico hasta Cádiz y en Canarias.

 Se trata de la tercera banda del gradiente dunar de las costas atlánticas. Tras las dunas móviles con *Ammophila arenaria*, la intensidad del viento disminuye y permite la estabilización del sustrato y la acumulación de **materia orgánica**<sup>1</sup> (dunas grises). Aun así, la pobreza de estos suelos incipientes y la influencia aún fuerte del viento, con sus efectos mecánicos y su aporte de aerosoles salinos, impide la evolución hacia una vegetación más madura. En el gradiente litoral se sitúa entre las dunas blancas (2120) y las comunidades leñosas de dunas maduras (2250, 2260, 2270).


 En el Cantábrico, este tipo de hábitat es escaso, y lleva un

pasto vivaz y pequeñas matas de tallos herbáceos, con *Crucianella maritima*, *Helicrysum stoechas*, *Koeleria glauca*, *Sporobolus arenarius*, *Carex arenaria*, etc. Entre Galicia y Cádiz, las dunas son más abundantes, siendo dominadas por especies rizomatosas de *Armeria*<sup>2</sup> (*A. pungens*, *A. welwitschii*), acompañadas por *Crucianella maritima* y otras de interés biogeográfico, como *Iberis procumbens*, *Thymus carnosus* (incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitat), *Echium gaditanum*, *Jasione lusitanica*, *Helichrysum italicum subsp. serotinum*, *Artemisia campestris subsp. maritima*, etc. Es frecuente la presencia de retazos de pastizales anuales (*Aira spp.*, *Rumex bucephalophorus*, *Petrorhagia prolifera* o *Tuberaria guttata*) En Canarias, estas dunas están presididas por *Traganum moqui-*



*Calystegia soldanella*

*nii* o *Zygophyllum fontanessi*, *theklae*) y el chotacabras gris (*Caprimulgus europaeus*).  
acompañadas por otras especies canarias: *Lottus lancerottensis*, *Androcymbium psammophilum* y *Convolvulus caput-medusae* (estas dos últimas incluidas en el Anexo II).

 Algunos representantes típicos son la salamaguesa común (*Tarentola mauritanica*), la cogujada montesina (*Galerida*

#### CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

163210; 163310; 163320; 163710

