






92 BOSQUES MEDITERRÁNEOS CADUCIFOLIOS

92B0 Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con *Rhododendron ponticum*, *Salix* y otras

Formaciones más o menos termófilas de ribera, de elevado interés geobotánico, propias del Macizo del Aljibe (comarca del Estrecho de Gibraltar) o de los Montes de Toledo, dominadas por rododendros béticos y alisos o por abedules endémicos.

 Se incluye en este tipo de hábitat, por un lado, la vegetación riparia de los llamados "canutos" de la serranía gaditana (alisedas con ojaranzo) y, por otro, las formaciones de *Betula pendula* var. *parvibracteata*, abedul endémico de las cabeceras y tramos medios de algunos arroyos de los Montes de Toledo.

 Se trata de formaciones ribereñas de suelos ácidos y de climas mediterráneos más o menos cálidos y húmedos. La serranía gaditana de El Aljibe es uno de los lugares más lluviosos de la Península, por los vientos cargados de humedad del Estrecho, y más cálidos, por su posición meridional y marítima.

 En esas condiciones de humedad, los angostos y neblino-


sos "canutos" de Cádiz acogen una flora lauroide relictas representativa de la vegetación tropical peninsular de la Era Terciaria. Destaca el ojaranzo¹ (*Rhododendron ponticum* subsp. *baeticum*), sólo presente en estas sierras y en el sur de Portugal. Con él, otras especies subtropicales o relictas como *Laurus nobilis*, *Aristolochia baetica*, *Arisarum proboscideum*, *Smilax mauritanica*, los helechos *Pteris palustris*, *Diplazium caudatum*, *Davallia canariensis*, etc., o incluso endemismos casi exclusivos de esta sierra, como *Frangula alnus* subsp. *baetica*.

Los abedulares de los barrancos de los Montes de Toledo son formaciones relictas que crecen a altitudes excepcionalmente bajas para lo habitual en el género *Betula*. Llevan una interesante mezcla de plantas



Ojaranzo (*Rhododendron ponticum*)

atlánticas y mediterráneas, con *Fraxinus angustifolia*, *Ilex aquifolium*, *Frangula alnus*, *Myrica gale* (sólo en algunos enclaves), *Brachypodium sylvaticum*, *Dryopteris affinis*, *Blechnum spicant*, y algunas otras prácticamente endémicas de la mitad occidental de la Península (*Galium broterianum*, *Carex paniculata* subsp. *lusitanica* o *Erica lusitanica*).

 La fauna de este tipo de hábitat es la propia de los bosques de ribera (92A0, 91E0, etc.).

