

SCROPHULARIACEAE

Linaria coutinhoi Valdés

Tras repetidas búsquedas en la provincia de Salamanca posteriores a su herborización en 1977, ha sido imposible volver a localizarla.



M. Bernal

Identificación

Terófito multicaule. Inflorescencia pauciflora que se alarga tras la floración. Pedicelos más largos que los sépalos y que las brácteas. Corola violácea con paladar amarillo, de unos 9 mm y espolón de 5 mm. Semillas discoideas, de menos de 1 mm y con ala muy estrecha.

Distribución y hábitat

Endemismo ibérico: riberas del Duero (Alto Douro y Douro Litoral) y riberas del Alagón (Salamanca: Sotoserrano, Alquería de Caballoria).

Existen referencias de este taxón en la provincia de Jaén^{1,2}. Una vez revisados estos pliegos llegamos a la conclusión de que no corresponden a *Linaria coutinhoi* sino a *L. intricata* Coincy.

Habita en depósitos fluviales de las riberas del Duero (Portugal) y del Alagón (Salamanca); 400 m.

Floración: (VII) VIII (IX). Fructificación: VII-IX.

Causas de extinción y medidas de conservación

Se podría intentar una reintroducción a partir de semillas de las poblaciones portuguesas.

Referencias: [1] CANO CARMONA *et al.* (1990); [2] CANO CARMONA & FERNÁNDEZ LÓPEZ (1986). **Autores:** A. GONZÁLEZ TALAVÁN, S. BERNARDOS HERNÁNDEZ, L. DELGADO SÁNCHEZ y E. RICO HERNÁNDEZ.

Ficha Roja

Categoría UICN para España: EX
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

Corología

UTM 1x1 visitadas:	8
UTM 1x1 confirmadas:	0
Poblaciones confirmadas:	0
Poblaciones nuevas:	0
Poblaciones extintas:	1
Poblaciones restituidas:	0
Poblaciones no confirmadas:	0
Poblaciones no visitadas:	0
Poblaciones descartadas:	0