



Foto: J. Martino


## Callianthemum coriandrifolium

En España esta especie aparece solamente en la zona central de la Cordillera Cantábrica, desde el Pico Huevo (San Isidro) hasta el Puerto de la Mesa (Somiedo). Se conocen once poblaciones bastante numerosas en un total de unas 100 ha de extensión. Se ha observado un escaso número de semillas y apenas algunas plántulas ya que flores y frutos son comidos por los animales. Parte de sus poblaciones están presentes en el Parque Natural de Somiedo y en el Paisaje Protegido de Peña Ubiña.

### SITUACIÓN ACTUAL



### SITUACIÓN FUTURA



### Evolución prevista

La depredación de flores y frutos por herbívoros podría explicar la escasez de plántulas que dificulta la renovación de las poblaciones. El riesgo de extinción es muy alto por lo que debe ser conservada ex situ y potencialmente reimplantada en zonas adecuadas.

### ESTADÍSTICA

#### Superficies actuales (km<sup>2</sup>)

- presencia: 12 (1%)
- área potencial: 724

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
• 2011-2040	3 (0%)	44 (6%)	0%	33%
• 2041-2070	0 (0%)	111 (15%)	0%	8%
• 2071-2100	0 (0%)	0 (0%)	0%	0%
<b>ECHAM4</b>				
• 2011-2040	1923 (266%)	419 (58%)	0%	0%
• 2041-2070	5778 (798%)	2051 (283%)	0%	0%
• 2071-2100	6946 (959%)	561 (78%)	0%	0%

### VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

*Ex situ:*

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

**Planificación y coordinación.**

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.