



© ARDEIDAS / JOSÉ LUIS DE LA CRUZ ALEMÁN

Caprimulgus ruficollis


Caprimulgus ruficollis (Chotacabras cuellirrojo). En Europa, únicamente presente en la Península Ibérica, donde se distribuye por toda la región biogeográfica mediterránea, con excepción de los principales sistemas montañosos. Ocupa zonas abiertas y áreas con arbolado y matorral mediterráneo dispersos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -4,5°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1167 mm anuales.

(Chotacabras cuellirrojo)

ESTATUS ACTUAL

NO EVALUADA

SITUACIÓN ACTUAL



PRESENCIA
ÁREA POTENCIAL

TSS: 0,5409

SITUACIÓN FUTURA

ECHAM4
CGCM2
CGCM2 Y ECHAM4

Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan aumentos en la distribución potencial actual de la especie entre un 67% y un 71% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de 100% en 2041-2070.

ESTADÍSTICAS


SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	167900 (33%)	% Protegido actualmente:	(23%)
Área potencial:	261100	% Protegido futuro:	(26%)

APF

OPF

CGCM2	A2		B2	
	Área (km²)	%	Área (km²)	%
2011-2040	300900	(15%)	284300	(9%)
2041-2070	380400	(46%)	345700	(32%)
2071-2100	412600	(58%)	365400	(40%)
ECHAM4				
2011-2040	415900	(59%)	415300	(59%)
2041-2070	447500	(71%)	437000	(67%)
2071-2100	474700	(82%)	449900	(72%)



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

• No se requieren medidas de adaptación.