



CENEAM-OAPN-MARM / FERNANDO CÁMARA ORGAZ


# Ciconia nigra

**Ciconia nigra (Cigüeña negra).** Se distribuye por el sur y centro de Europa de manera muy dispersa. En la Península Ibérica ocupa fundamentalmente el cuadrante suroccidental, donde está ligada a dehesas, áreas boscosas más o menos próximas a zonas húmedas y medios rupícolas. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -3,6°C y 36°C, y el de precipitaciones entre 407 mm y 1290 mm anuales.

# (Cigüeña negra)

## SITUACIÓN ACTUAL

## SITUACIÓN FUTURA



PRESENCIA  
ÁREA POTENCIAL

TSS: 0,6619

- ECHAM4
- CGCM2
- CGCM2 Y ECHAM4

### Evolución Prevista:


Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos moderados en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 42% y un 46% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 3% y un 6% en 2041-2070.

## ESTADÍSTICAS

### SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	47300	(9%)	% Protegido actualmente:	(8%)
Área potencial:	128200		% Protegido futuro:	(0%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
2011-2040	71400 (-44%)	53900 (-58%)	(65%)	(55%)
2041-2070	82200 (-36%)	68800 (-46%)	(36%)	(50%)
2071-2100	86000 (-33%)	70900 (-45%)	(20%)	(36%)
<b>ECHAM4</b>				
2011-2040	63500 (-50%)	61200 (-52%)	(10%)	(10%)
2041-2070	69400 (-46%)	74200 (-42%)	(3%)	(6%)
2071-2100	55200 (-57%)	63600 (-50%)	(1%)	(2%)



### MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.