




© RICARDO G. CALMAESTRA

# Lanius senator

**Lanius senator (Alcaudón común).** En Europa, ocupa principalmente la región mediterránea y una pequeña parte del centro del continente. Se destruye ampliamente por la región mediterránea peninsular. Prefiere medios abiertos, principalmente bosque o matorral mediterráneo aclarado, aunque también está presente en áreas de cultivo y sotos de ribera. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6,2°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1737 mm anuales.

# (Alcaudón común)

## SITUACIÓN ACTUAL



TSS: 0,6520

## SITUACIÓN FUTURA

- ECHAM4
- CGCM2
- CGCM2 Y ECHAM4

### Evolución Prevista:


Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan aumentos en la distribución potencial actual de la especie entre un 18% y un 19% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial no se reduce en 2041-2070.

## ESTADÍSTICAS

### SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	379600 (75%)	% Protegido actualmente:	(56%)
Área potencial:	388700	% Protegido futuro:	(60%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
2011-2040	390300 (0%)	379600 (-2%)	(92%)	(90%)
2041-2070	423700 (9%)	410600 (6%)	(98%)	(96%)
2071-2100	437200 (12%)	418200 (8%)	(99%)	(97%)
<b>ECHAM4</b>				
2011-2040	442600 (14%)	441100 (13%)	(99%)	(99%)
2041-2070	463900 (19%)	460100 (18%)	(100%)	(100%)
2071-2100	476200 (23%)	472300 (22%)	(100%)	(100%)



### MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- No se requieren medidas de adaptación.