



© MARIO JAVIER PERIANES CARRASCO

Parus caeruleus


Parus caeruleus (Herrerillo común). Se distribuye por prácticamente toda Europa, excepto la porción más septentrional. Ocupa la casi totalidad de la Península Ibérica, siendo más escasa en las áreas desarboladas del valle del Ebro y sureste árido. Presente en cualquier tipo de masa forestal, incluso las más abiertas. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 228 mm y 1949 mm anuales.

(Herrerillo común)

ESTATUS ACTUAL

NO EVALUADA

SITUACIÓN ACTUAL



TSS: 0,5645

SITUACIÓN FUTURA



Evolución Prevista:


Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos moderados en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 65% y un 68% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 31% y un 33% en 2041-2070.

ESTADÍSTICAS

SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	412600 (82%)	% Protegido actualmente:	(62%)
Área potencial:	404800	% Protegido futuro:	(23%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
2011-2040	310700 (-23%)	306200 (-24%)	(70%)	(69%)
2041-2070	229000 (-43%)	259200 (-36%)	(54%)	(60%)
2071-2100	177100 (-56%)	234100 (-42%)	(42%)	(55%)
ECHAM4				
2011-2040	156400 (-61%)	152500 (-62%)	(37%)	(36%)
2041-2070	131400 (-68%)	141600 (-65%)	(31%)	(33%)
2071-2100	108700 (-73%)	131600 (-67%)	(26%)	(31%)



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.