




Foto: D. Galicia

Sideritis serrata

Es un endemismo ibérico del que sólo se ha encontrado una población en la alineación principal de la Sierra de Abenuj (Tobarra, Albacete), así como en un promontorio próximo separado por cultivos. Forma parte de romeral-tomillares mixtos en laderas pedregosas calcáreas. La especie presenta una población abundante y bien equilibrada en cuando a estructura de edades.

SITUACIÓN ACTUAL



■ Presencia
■ Área potencial

SITUACIÓN FUTURA

■ CGCM2
■ ECHAM4
■ CGCM2 y ECHAM4

Evolución prevista

Se prevé que las áreas potenciales futuras no se conservan en la zona de ocupación actual lo que llevaría a la desaparición de la especie. Se hace necesaria su conservación ex situ. La traslocación es azarosa porque las áreas potenciales futuras no son estables en los modelos.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 13 (14%)
- área potencial: 89

| | APF | | OPF | |
|---------------|--------------|--------------|-----|-----|
| | A2 | B2 | A2 | B2 |
| CGCM2 | | | | |
| • 2011-2040 | 259 (291%) | 137 (154%) | 0% | 23% |
| • 2041-2070 | 91 (102%) | 56 (63%) | 0% | 0% |
| • 2071-2100 | 7694 (8645%) | 286 (321%) | 0% | 0% |
| ECHAM4 | | | | |
| • 2011-2040 | 24 (27%) | 2876 (3232%) | 0% | 0% |
| • 2041-2070 | 2131 (2394%) | 62 (70%) | 0% | 31% |
| • 2071-2100 | 0 (0%) | 2 (2%) | 0% | 0% |

VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.