



Foto: J. Martínez Huelves

Sorbus domestica

El serbal común aparece en el centro oriente de la Península, en localizaciones desde los 200 m hasta los 1200 sobre pendientes moderadas o suaves y evitando las zonas más insoladas. Se asocia con precipitaciones débiles y temperaturas máximas estivales moderadas.

SITUACIÓN ACTUAL



■ Presencia
■ Área potencial

SITUACIÓN FUTURA

■ CGCM2
■ ECHAM4
■ CGCM2 y ECHAM4

Evolución prevista

Se prevé una reducción muy significativa de su área de distribución por lo que las poblaciones actuales deben ser objeto de vigilancia y debe contemplarse actuaciones de recogida de germoplasma así como atender a esta especie dentro de los planes de los bosques en los que aparece.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 334 (3%)
- área potencial: 9202

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	2107 (23%)	1889 (20%)	24%	1%
• 2041-2070	1521 (16%)	1770 (19%)	12%	2%
• 2071-2100	133 (1%)	300 (3%)	0%	3%
ECHAM4				
• 2011-2040	13129 (143%)	13983 (152%)	48%	69%
• 2041-2070	6669 (72%)	713 (8%)	34%	0%
• 2071-2100	113 (1%)	2929 (32%)	11%	14%

VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

1. Protección de espacios actuales.

Ex situ:

2. Recolección de germoplasma.

Generales:

3. Plan de gestión general.

El serbal común debe contemplarse explícitamente en los planes de gestión de los bosques en los que aparece.