

BIBLIOGRAFÍA

- ADECAB. 1992. Las labores forestales dañan a los buitres negros de Iruelas. *Quercus*, 80:11.
- Alda, F., Alcaraz, L., Hernández, M., Doadrio, I., García-Garitagoitia, J. L. y Gaitero, T. 2006. *Estudio genético e inmunológico del conejo silvestre: implicaciones epidemiológicas y poblacionales de las traslocaciones y reintroducciones*. Informe inédito. Madrid.
- Allen, G. T., Veatch, J. K., Stroud, R. K., Vendel, C. G., Poppenga, R.H., Thompson, L., Shafer, J. A. y Braselton, W. E. 1996. Winter poisoning of coyotes and raptors with furadan-laced carcass baits. *Journal of Wildlife Disease* 32: 385-389.
- Alonso, J. A. y Alonso, J. C. 1999. Colisión de aves con líneas de transporte eléctrico en España. En: Ferrer, M. y Janss, G. F. E. *Aves y líneas eléctricas*. Ed. Quercus. Madrid.
- Alvarado, E. 1983. *El Sector Forestal en Extremadura. Ecología y Economía*. Diputación Provincial de Cáceres. Trujillo.
- Álvarez, E. y Garcés, F. 1995. Movimientos en el período de dependencia y dispersión de los jóvenes de Buitre Negro *Aegypius monachus*. *Congreso Internacional Rapaces del Holártico*. Badajoz.
- 1996. Técnicas de recuperación, reintroducción y seguimiento radiotelemétrico de buitre negro *Aegypius monachus*. En: Muntaner, J. y Mayol, J. *Biología y Conservación de las Rapaces Mediterráneas*. Monografía nº 4. SEO/BirdLife. Madrid.
- Andrés, J. A., Segovia, C. y Galán, R. 1996. Situación actual y evolución poblacional reciente (1983-1994) de la colonia de buitre negro *Aegypius monachus* de Sierra Pelada (Huelva, España). En: Muntaner, J. y Mayol, J. *Biología y Conservación de las Rapaces Mediterráneas*. Monografía nº 4. SEO/BirdLife. Madrid.
- Anes, G. y García, A. (coords.). 1994. *Mesta, trashumancia y vida pastoril*. Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas. Valladolid.
- Angulo, E. y Villafuerte, R. 2004. Modelling hunting strategies for the conservation of wild rabbit populations. *Biological Conservation* 115: 291-301.
- Antoniou, V., Zantapoulou, N., Skartsi, D. y Tsoukali-Papadopoulou, H. 1996. Pesticide poisoning of animals of wild fauna. *Vet. Human Toxicol* 38: 212-213.
- Aragüés, A. y Lucientes, J. 1980. *Fauna de Aragón: las Aves*. Guara Editorial. Zaragoza.
- Arenas, R. 2004. Programa para la conservación del buitre negro *Aegypius monachus* en Andalucía. En: *Resúmenes del Symposium Internacional sobre buitre negro*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.
- Arenas, R. y Dobado, P. 2006. *The Black Vulture: Status, Conservation and Studies*. Diputación de Córdoba. Córdoba.
- Armstrong, D. J. Correlation between nectar supply and aggression in territorial honeyeaters: causation or coincidence? *Behavioral Ecology and Sociobiology* 30: 95-102.
- Arroyo, B. y Razin, M. 2005. Effect of human activities on bearded vulture behaviour and breeding success in the French Pyrenees. *Biological Conservation* 128: 276-284.
- Asensio, B. (coord.). 2002. *La Naturaleza de España*. Ed. J. M. Reyero. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- Asociación Empresarial Eólica/AEE. 2006. *Eólica 2006. Windpower 2006. Anuario del sector: análisis y datos*. AEE. Madrid.

Bibliografía

- Atienza, J. C., Muñoz, M. y Del Moral, J. C. 2001. Nesting habitat of black vultures *Aegypius monachus* and its implications for management. *Resúmenes del 4th Eurasian Congress on Raptors*. Estación Biológica de Doñana-Raptor Research Foundation. Sevilla.
- Atienza, J. C. y Rabadán, C. 2001. *Modelo de gestión forestal y revisión de los cotos más conflictivos de la Comunidad de Madrid. Actuaciones dirigidas a la conservación del buitre negro*. Informe inédito realizado por SEO/BirdLife para la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
- Austin, M. P. 2002. Spatial prediction of species distribution: an interface between ecological theory and statistical modelling. *Ecological Modelling* 157: 101-118.
- Aymerich, M. 1982. Etude comparative des régimes alimentaires du lynx pardelle (*Lynx pardina* Temminck 1824) et du chat sauvage (*Felis sylvestris* Schreber 1777) au centre de la péninsule Ibérique. *Mammalia* 46 (4): 515-522.
- Azcárate, J. M. y Carbonell, R. 2004. El buitre negro *Aegypius monachus* en Castilla y León. Estatus y conservación. En *Symposium Internacional sobre buitre negro*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.
- Azcárate, J. M., Carbonell, R. y Jiménez, F. J. *En prensa*. El buitre negro *Aegypius monachus* en Castilla y León (España). En: Arenas, R. M. y Dobado, P. M. (coords.). *The Black Vulture: Status, Conservation and Studies*. Diputación de Córdoba. Córdoba.
- Baillie, J., Hilton-Taylor, C. y Stuart, S. 2005. *The 2004 IUCN Red List of threatened species. A global species assessment: executive summary*. IUCN.
- Baker, P. J., Harris, S., Robertson, C. P. J., Saunders, G. y White, P. C. L. 2001. Differences in the capture rate of cage-trapped red foxes *Vulpes vulpes* and an evaluation of rabies control measures in Britain. *Journal of Applied Ecology* 38 (4): 823-835.
- Baker, P. J. y Harris, S. 2006. Does culling reduce fox *Vulpes vulpes* density in commercial forests in Wales, UK? *European Journal of Wildlife Research* 52 (2): 99-108.
- Ballesteros, F. 1998. *Las especies de caza en España. Biología, Ecología y Conservación*. Ed. Estudio y gestión del medio ambiente. Oviedo.
- Ballesteros, F. y Robles, L. 2005. *Manual de manejo y gestión del hábitat del urogallo cantábrico*. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- Banks, P. B., Dickman, C. R. y Newsome, A. E. 1998. Ecological costs of feral predator control: foxes and rabbits. *Journal of Wildlife Management* 62 (2): 766-772.
- Banks, P. B., Hume, I. D. y Crowe, O. 1999. Behavioural, morphological and dietary response of rabbits to predation risk from foxes. *Oikos* 85 (2): 247-256.
- Banks, P. B. 2000. Can foxes regulate rabbit populations? *Journal of Wildlife Management* 64: 639-648.
- Baños, J. V. 2004. *Patología (tuberculosis y elafostrogilosis) del ciervo Cervus elaphus en Castilla-La Mancha: problemática asociada a su gestión*. Tesis doctoral. Universidad de Murcia.
- Barea, J. M., Ballesteros, E. y Gil, J. M. 2001. Ecología trófica del tejón (*Meles meles* L. 1758) en una localidad de las sierras subbéticas (S. E. España). Resultados preliminares. *Galemys* 13: 127-138.
- Bárcena, J., Morales, M., Vázquez, B., Boga, J. A., Parra, F., Lucientes, J., Pagées-Manté, A., Sánchez-Vizcaíno, J. M., Blasco, R. y Torres, J. M. 2000. Horizontal transmissible protection against Myxomatosis and Rabbit Hemorrhagic Disease by using a recombinant myxoma virus. *Journal of Virology* 74: 1114-1123.
- Barlow, N. D. 2000. The ecological challenge of immunocontraception: editor's introduction. *Journal of Applied Ecology* 37 (6): 897-902.
- Barnett, E. A., Fletcher, M. R., Hunter, K. y Sharp, E. A. 2002. *Pesticide poisoning of animals 2000: Investigations in suspected incidents in the United Kingdom*. Informe del Environmental Panel of the Advisory Committee on Pesticides. Reino Unido.
- Barrios, L. y Rodríguez, A. 2004. Behavioural and environmental correlates of soaring-bird mortality at on-shore wind turbines. *Journal of Applied Ecology* 41: 72-81.
- Bautista, L. M., García, J. T., Calmaestra, R. G., Palacín, C., Martín, C., Morales, M. B., Bonal, M. y Viñuela, J. 2004. Effects of weekend traffic on the use of space by raptors. *Conservation Biology* 18 (3): 726-732.

- Bayliss, J.L., Simnite, V., Thompson, S. 2005. The use of probabilistic habitat suitability models for biodiversity action planning. *Agriculture, Ecosystems & Environment* 108: 228-250.
- Bea, A., Beitia, R. y Fernández, J. M. 2003. The census and distribution of wintering pigeons *Columba palumbus* in the Iberian peninsula. *Ornis Hungarica*, 12-13: 157-167.
- Belinchon, S. J., Clobert, J. y Massot, M. 1996. What differences in fitness components between philopatric and dispersing individuals? *Acta Oecologica* 17: 503-517.
- Bell, D. J. y Webb, N. J. 1991. Effects of climate on reproduction in the European wild rabbit (*Oryctolagus cuniculus*). *Journal of Zoology of London* 224: 639-648.
- Beltrán, J. F. 1991. Temporal abundance pattern of the wild rabbit in Doñana, SW Spain. *Mammalia* 55: 591-595.
- Bermejo, C. 1991. Situación actual del Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en la provincia de Ávila. En: *I Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras*: 87-92. AEDENAT-CODA-ICONA.
- Bernis, F. 1966. El buitre negro *Aegypius monachus* en Iberia. *Ardeola* 12: 45-99.
- BirdLife International. 2004a. *Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status*. BirdLife Conservation Series N° 12. Cambridge.
- 2004b. *Threatened Birds of the World 2004*. CD-Rom. BirdLife Conservation Series. Cambridge.
- 2004c. *Birds in the European Union: a status assessment*. Wageningen. The Netherlands. BirdLife International.
- Blanco, A. 2002. La sierra salmantina de Quilamas necesita protección legal. *Quercus* 195: 50-51.
- 2006. Una herida en el corazón de Las Quilamas: abierta una pista junto a una colonia de buitre negro. *Quercus* 261: 82.
- Blanco, G., Traverso, J. M., Marchamalo, J. y Martínez, F. 1997. Interspecific and intraspecific aggressions among Griffon and Cinereous vultures at nesting and foraging sites. *Journal of Raptor Research* 31: 77-79.
- Blanco, G., Donazar, J. A., Hiraldo, F., Soto-Largo, E. y Oria, J. 2002. Gestión forestal y conservación del buitre negro: un estudio comparativo a largo plazo en las colonias de Sierra Pelada y Valle de Iruelas. En: F. Sánchez-Herrera (ed.). *Terceras Jornadas Científicas del Parque Natural de Peñalara y del Valle del Paular*. Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. Rascafría.
- Blanco, J. C. y González, J. L. (eds.). 1992. *Libro rojo de los vertebrados de España*. Colección técnica. ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- Blanco, J. C. y Villafuerte, R. 1993. *Factores ecológicos que influyen sobre las poblaciones de conejos. Incidencia de la enfermedad hemorrágica*. Informe técnico. Empresa de Transformación Agraria, S.A. Madrid.
- Blanco, J. C. 1998. *Mamíferos de España*. Ed. Planeta. Barcelona.
- Blount, J. D., Houston, D. C, Moller, A. P., Wright, J. 2003. Do individual branches of immune defense correlate? A comparative case study of scavenging and non-scavenging birds. *Oikos* 102: 340-350.
- Borralho, R., Stoate, C. y Araújo, M. 2000. Factors affecting the distribution of Red-legged Partridges *Alectoris rufa* in an agricultural landscape of southern Portugal. *Bird Study* 47 (3): 304-310.
- Bosque, J. 1997. *Sistemas de información geográfica*. Ediciones Rialp, S. A. Madrid.
- Bowerman, W. W., Best D. A., Giesy, O. P., Shieldcastle M. C., Meyer M. W., Postupalsky S. y Sikarskie J. G. 2003. Associations between regional differences in polychlorinated biphenyls and dichloro-diphenyl-dichloro-ethylene in blood of nestling bald eagles and reproductive productivity. *Environmental Toxicology Chemistry* 22 (2): 371-376.
- Bradley, M. P. 1994. Experimental strategies for the development of an immun contraceptive vaccine for the European red fox *Vulpes vulpes*. *Reproduction, fertility and development* 6: 307-317.
- Brown, J. L. 1969. Territorial behavior and population regulation in birds: A review and reevaluation. *Wilson Bulletin* 19: 293-329.
- Buckland, S. T., Elston, D. A. 1993. Empirical models for the spatial distribution of wildlife. *Journal of Applied Ecology* 30: 478-495.
- Burger, J. 1995. A risk assessment for lead in birds. *Journal of Toxicology and Environmental Health* 45: 369-396.

Bibliografía

- Burt, W. H. 1943. Territoriality and home range concepts as applied to mammals. *Journal of Mammalogy* 24: 346-352.
- Bustamante, J. y Seoane, J. 2004. Predicting the distribution of four species of raptors (Aves: Accipitridae) in southern Spain: statistical models work better than existing maps. *Journal of Biogeography* 31: 295-306.
- Buxadé, C. 2002. *Gestión de explotaciones ganaderas*. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
- BVCF-FZS. 2000. *Resúmenes del Congreso Internacional sobre el uso ilegal de veneno en el medio natural*. Black Vulture Conservation Foundation-Frankfurt Zoological Society-SEO/BirdLife. Alcudia.
- Caballero, J. 1986. Buitre negro en Gredos. *Panda* 13: 11-14.
- Caballero, R. 1985. *Hábitat y alimentación del ciervo en ambiente mediterráneo*. Monografías, 34. ICONA. Madrid.
- Calvete, C., Villafuerte, R., Lucientes, J. y Osácar, J. J. 1997. Effectiveness of traditional wild rabbit restocking in Spain. *Zoology* 241: 271-277.
- Calvete C. 2002. *Biología y gestión del conejo silvestre*. Informe inédito. Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. Zaragoza.
- Calvete, C., Estrada, R., Villafuerte, R., Osácar, J. J. y Lucientes, J. 2002. Epidemiology of viral haemorrhagic disease and myxomatosis in a free-living population of wild rabbits. *Veterinary Record* 150: 776-782.
- Calvete, C. y Estrada, R. 2004. Short-term survival and dispersal of translocated European wild rabbits. Improving the release protocol. *Biological Conservation* 120: 507-516.
- Calvete, C. 2006a. Los problemas de gestión del conejo silvestre. *Quercus* 244: 17-20.
- 2006b. Modeling the effect of population dynamics on the impact of rabbit hemorrhagic disease. *Conservation Biology* 20 (4): 1232-1241.
- 2006c. The use of immunization programmes in wild populations: modelling effectiveness of vaccination campaigns rabbit haemorrhagic disease. *Biological Conservation* 130 (2): 290-300.
- Calvete, C., Pelayo, E. y Sampietro, J. 2006. Habitat factors related to wild rabbit population trends alter the initial impact of rabbit haemorrhagic disease. *Wildlife Research* 33 (6): 467-474.
- Calzada, J. y Palomares, F. 1996. Frecuencia de aparición de diferentes restos de conejos en excrementos de lince y zorro. *Doñana Acta Vertebrata* 23 (2): 243-252.
- Camiña, A. 2004. Consequences of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) on breeding success and food availability in Spanish vulture populations. En: Chancellor, R. D. y Meyburg, B. U. (eds.). *Raptors Worldwide*. WWGBP/MME.
- Camiña, A. y Montelio, E. 2006. Griffon Vulture *Gyps fulvus* food shortages in the Ebro Valley (NE Spain) caused by regulations against Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE). *Acta Ornithologica* 41 (1): 1-8.
- Camprodón, J. y Plana, E. (eds.). 2001. *Conservación de la biodiversidad y gestión forestal: su aplicación en la fauna vertebrada*. Universidad de Barcelona. Barcelona.
- Cano, E. y Ruiz, I. 1997. *Modelos de capacidad de carga para el ciervo y para la ganadería ovino-caprina en Parques Naturales de Jaén*. Instituto de Estudios Jienenses. Jaén.
- Cardiel, I. (ed.). *El milano real en España. Censo 2004*. SEO-BirdLife. Madrid.
- Cardoso, M., Hyatt, A., Selleck, P., Lowther, S., Prakash, V., Pain, D., Cunningham, A. A. y Boyle D. 2005. Phylogenetic analysis of the DNA polymerase gene of a novel alphaherpesvirus isolated from an Indian Gyps vulture. *Virus Genes* 30: 371-378.
- Carpenter, F. L. y MacMillen, R. E. 1976. Threshold model of feeding territoriality and test with a Hawaiian honeycreeper. *Science* 194: 634-642.
- Carranza, J. 2002. Ciervo *Cervus elaphus* Linnaeus, 1758. En: Palomo, J. y J. Gisbert (eds.). *Atlas de los Mamíferos terrestres de España*. Dirección General para la Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU. Madrid.
- Carrete, M. y Donázar, J. A. 2005. Application of central-place theory shows the importance of Mediterranean dehesas for the conservation of the cinereous vulture *Aegypius monachus*. *Biological Conservation* 126: 582-590.

- Castaño, J. P. 2006. *El águila imperial ibérica (Aquila adalberti B.) en Castilla-La Mancha*. Estatus, ecología y conservación. Ed. Juan Pablo Castaño López. Toledo.
- Caughley, G., Pech, R. y Grice, D. 1992. Effect of fertility control on a population's productivity. *Wildlife Research* 19: 623-627.
- Ceña, A. y Ceña, J. C. 1990. Nuevos datos de cría antigua del buitre negro en la provincia de Soria. *Ardeola* 37: 333.
- Coca, E. 2003. *Manual ecológico del cazador*. Fundación Biodiversidad. Madrid.
- Collar, N. J., Crosby, M. S. y Stattersfield, A. J. 1994. *Birds to Watch 2: The World List of Threatened Birds*. BirdLife Conservation Series nº 4. BirdLife International. Cambridge.
- Coman, B. J., Robinson, J. y Beaumont, C. 1991. Home range, dispersal and density of red foxes (*Vulpes vulpes* L.) in central Victoria. *Wildlife Research* 18: 215-223.
- Comisión Europea. 2001. Reglamento CE 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles. *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* 147: 1-40.
- 2002. Reglamento CE 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano. *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* 273: 1-58.
- 2003. Decisión 2003/322/CE de la Comisión de 12 de mayo de 2003 sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento CE 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a la alimentación de las especies de aves necrófagas con determinados materiales de la categoría 1. *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* 117: 32-34.
- 2005a. Decisión 2005/830/CE de la Comisión de 25 de noviembre de 2005 por la que se modifica la Decisión 2003/322/CE en lo relativo a la alimentación de algunas especies de aves necrófagas con determinados materiales de categoría 1. *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* 311: 40.
- 2005b. *Hoja de ruta para las EET*. Informe inédito. Comisión Europea. Bruselas (<http://www.sandach.com.es/Publico/DocInteres.aspx>).
- 2005c. Reglamento CE nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativa a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). *Diario Oficial de la Unión Europea* 277: 1-40.
- 2006. *Detener la pérdida de biodiversidad para 2010 – Y más adelante*. Comunicación de la Comisión. Bruselas (http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_2006/pdf/com_2006_216_es.pdf).
- Conde de Yebes. 2002. *Veinte años de caza mayor*. Ed. Al-Ándalus. Sevilla.
- Consejería de Agricultura y Medio Ambiente –Andalucía–. Ficha resumen del borrador de plan de recuperación de buitre negro en Andalucía (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/fauna/planesflorafaua.html#02>).
- Consejería de Agricultura –Castilla-La Mancha–. 1998. Decreto 33/98 de 5 de mayo de 1998 por el que se aprueba el catálogo regional de especies amenazadas. *Diario Oficial de Castilla-La Mancha*.
- Consejería de Medio Ambiente –Andalucía–. 1990. Decreto 194/1990 de 19 de junio por el que se establecen normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión con conductores no aislados. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía* 79.
- 2003. *Ley 8/2003 de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna silvestres de Andalucía*. Junta de Andalucía. Sevilla.
- 2004. *Resúmenes del International Symposium on the Black Vulture Aegypius monachus*. Junta de Andalucía. Córdoba.
- Consejería de Agricultura y Medio Ambiente –Castilla-La Mancha–. 1999. Decreto 5/1999 de 2 de febrero por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta y baja tensión con fines de protección de la avifauna. *Diario Oficial de Castilla La Mancha* 9.
- Consejería de Medio Ambiente –Castilla-La Mancha–. 2003. Decreto 275/2003, de 9-09-2003, por el que se aprueban los planes de recuperación del águila imperial ibérica, de la cigüeña negra y el plan de

Bibliografía

- conservación del buitre negro, y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha. *Diario Oficial de Castilla-La Mancha* 131.
- Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural –Castilla-La Mancha–. 2005. Orden de 02-08-2005 por la que se aprueba el Plan Regional de lucha contra el uso ilegal de venenos en el medio natural. *Diario Oficial de Castilla-La Mancha* 162.
- Consejería de Agricultura y Medio Ambiente –Extremadura– 2001. Decreto 37/2001 de 13 de marzo de 2001 por el que se aprueba en catálogo regional de especies amenazadas. *Diario Oficial de Extremadura*.
- 2005. Orden de 6 de junio de 2005 por la que se aprueba el Plan de Conservación de Hábitat del Buitre negro en Extremadura. *Diario Oficial de Extremadura* 71.
- Consejería de Agricultura –Madrid– 1992. Decreto 18/92 de 9 de abril de 1992, por el que se aprueba el catálogo regional de especies amenazadas. *Diario Oficial de la Comunidad de Madrid*.
- Consultora de Recursos Naturales. 2005. *Modelo de aprovechamiento cinegético compatible con la conservación del Lince ibérico en Montes de Toledo-Guadalmena*. Informe inédito. Fundación CBD-Hábitat. Madrid.
- Cooke, B. D. 1990. Rabbit burrows as environments for European rabbit fleas, *Spilosyllus cuniculi* (Dale), in arid South Australia. *Australian Journal of Zoology* 38: 317-325.
- 2002. Rabbit haemorrhagic disease: field epidemiology and the management of wild rabbit populations. *Revue Scientifique et Technique Office International des Epizooties* 21: 347-358.
- Corbacho, C., Costillo, E., Lagoa, G. y Morán, R. 2001. Effect of breeding cycle on foraging areas and home-range of black vulture *Aegypius monachus* in Extremadura. *Resúmenes del 4º Eurasian congress on raptors*. Estación Biológica de Doñana-Raptor Research Foundation. Sevilla.
- Corbacho, C., Costillo, E. y Morán, R. 2004. *Foraging areas and home-ranges of black vulture Aegypius monachus: a preliminary analysis*. Póster presentado en el Symposium Internacional sobre buitre negro. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.
- Corsi, F., Duprè, E. Boitani, L. 1999. A large-scale model of wolf distribution in Italy for conservation planning. *Conservation Biology* 13:150-159.
- Costa, J. C. 2002. *Manual para la diversificación del paisaje agrario*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
- Costillo, E., Corbacho, C., Acedo, F., Rodríguez, M. y Sánchez, J. M. 2001. Effect of european rabbit *Oryctolagus cuniculus* population decline on diet of black vulture *Aegypius monachus* in Extremadura (SW Spain). *Resúmenes del 4º Eurasian congress on raptors*. Estación Biológica de Doñana-Raptor Research Foundation. Sevilla.
- Costillo, E., Morán, R., Lagoa, G., Corbacho, P. y Villegas, A. 2001. Núcleos reproductores y evolución de las poblaciones de Buitre Negro *Aegypius monachus* en Extremadura. *Resúmenes del Congreso Internacional «Gestión de ZEPA en Extremadura: Águila Perdicera y Buitre Negro»*. Cáceres.
- Costillo, E., Sánchez, J. M., Corbacho, C. 2002. Evolución poblacional y éxito reproductivo del Buitre Negro *Aegypius monachus* en Extremadura. En: F. Sánchez-Herrera (ed.). *Terceras Jornadas Científicas del Parque Natural de Peñalara y del Valle de El Paular*. Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. Rascafría.
- Costillo, E., Corbacho, C., Sánchez, J. M. y Acedo, F. 2004a. *Cambios en la dieta del buitre negro Aegypius monachus ante la disminución de las poblaciones de conejo Oryctolagus cuniculus en Extremadura*. Póster presentado en el Symposium Internacional sobre Buitre negro. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.
- Costillo, E., Corbacho, C., Morán, R. y Acedo, F. 2004b. *La alimentación del buitre negro Aegypius monachus: adaptabilidad y plasticidad de un ave carroñera en la Península Ibérica*. Poster presentado en XV Congreso Español de Ornitología. Madrid.
- Costillo, E. 2005. *Biología y Conservación de las poblaciones de Buitre Negro Aegypius monachus en Extremadura*. Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura.
- Côte, I. M. y Sutherland, W. J. 1997. The effectiveness of removing predators to protect bird populations. *Conservation Biology* 11 (2): 395-405.

- Couto, S., Gutiérrez, J. E. y Ruiz, A. 2005. *Potencial impact of the illegal use of poisoned bait on the reintroduction of the Bearded vulture (Gypaetus barbatus) in Andalusia*. Informe inédito. Fundación Gypaetus. Jaén.
- Covisa, J. 1998. *Ordenación cinegética: proyectos de ordenación y planes técnicos*. Cinegética y Naturaleza Ediciones. Madrid.
- Cramp, S. y Simmons, K. E. L. (eds.). 1980. *The Birds of the Western Palearctic, vol. I*. Oxford University Press, Oxford.
- 1980. *The Birds of the Western Palearctic, vol. II*. Oxford University Press, Oxford.
- Cramp, S. 1998. *The Complete Birds of the Western Palearctic on CD-Rom*. Oxford University Press. Oxford.
- Cuevas, J. A. y De la Puente, J. 2005. *Hábitat potencial del buitre negro Aegypius monachus en la sierra de Guadarrama (Madrid)*. Serie Documentos nº 45. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Centro de Investigaciones Ambientales de la Comunidad de Madrid «Fernando González Bernáldez». Madrid.
- Davis, P. 1993. Red Kite *Milvus milvus*. En: Gibbons, D. W., Reid, J.B. y Chapman, R. A. (eds.). *The New Atlas of Breeding Birds – Britain and Ireland: 1988-1991*. T & AD Poyser. Londres.
- De Andrés, A. J., Segovia, C. y Galán, R. 1995. Present status of the Sierra Pelada Black Vulture colony (Huelva, Spain) and its conservation problems. En: Tewes, E., Sánchez, J. J. y Bijleveld, M. (eds.). *Black Vulture Conservation in Europe*. BVCF. Palma de Mallorca.
- De Blas, C. 1988. *Alimentación del conejo*. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
- De Juana, E. y De Juana, F. 1984. Cabaña ganadera y distribución y abundancia de los buitres común *Gyps fulvus* y negro *Aegypius monachus* en España. *Rapinyaires Mediterranis* 2: 32-45.
- De la Puente, J. *En prensa*. Fracaso reproductivo en una población de buitres negros *Aegypius monachus* del centro de España. En: Arenas, R. M. y Dobado, P. M. (coords.). *The Black Vulture: Status, Conservation and Studies*. Diputación de Córdoba. Córdoba.
- De la Puente, J., Del Moral, J. C. y Martí, R. 2002. El reto de conservar el buitre negro en el Alto Lozoya. *Quercus* 200: 88-89.
- De la Puente, J. y Elorriaga, J. 2004. *The use of moult for ageing Eurasian black vultures*. Póster presentado en el Symposium Internacional sobre Buitre negro. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.
- De la Puente, J. 2005. *Seguimiento de la colonia de buitre negro de Rascafría (Parque Natural de Peñalara). Año 2005*. Informe inédito realizado por SEO/BirdLife para el Parque Natural de Peñalara. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Madrid.
- 2006a. **Effect of monitoring frequency and date on estimates of abundance and productivity of colonial black vultures *Aegypius monachus* in Central Spain**. En: Houston, D. C. y Piper, S. E. (eds.). *Proceedings of the International Conference on Conservation and Management of Vulture Populations*. 14-16 November 2005, Thessaloniki, Greece. Natural History Museum of Crete & WWF Greece.
- De la Puente, J. y Gamonal, J. 2006b. Age determination of black vulture *Aegypius monachus* pulli in the nest. En: Houston, D. C. y Piper, S. E. (eds.). *Proceedings of the International Conference on Conservation and Management of Vulture Populations*. 14-16 November 2005, Thessaloniki, Greece. Natural History Museum of Crete & WWF Greece.
- De la Puente, J. 2006c. *Fenología y parámetros reproductivos del buitre negro *Aegypius monachus* en España central*. Comunicación en forma de póster al XVIII Congreso Español de Ornitología. Elche.
- 2006d. *Seguimiento de la colonia de buitre negro de Rascafría (Parque Natural de Peñalara). Año 2006*. Informe inédito realizado por SEO/BirdLife para el Parque Natural de Peñalara. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Madrid.
- De Lucas, M., Janss, G. F. E. y Ferrer, M. 2004. The effects of a wind farm on birds in a migration point: the Strait of Gibraltar. *Biodiversity and Conservation* 13: 395-407.

Bibliografía

- Dean, J., Latimer, K. S., Oaks, J. L., Schrenzel, M., Redig, P. T. y Wunschmann, A. 2006. Falcon adenovirus infection in breeding Taita falcons (*Falco fasciinucha*). *Journal Veterinary Diagnostic Invest.* 18: 282-286.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. 1994. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guinea-fowl*. Lynx Edicions. Barcelona.
- Del Moral, J. C. y Martí, R. 2001. *El Buitre Leonado en la Península Ibérica*. SEO/BirdLife. Madrid.
- Del Moral, J. C., Martín, R., Muñoz, M., De la Puente, J. y Ruiz, A. 2002. Seguimiento de la colonia de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) de la ZEPA del Alto Lozoya (1997-2000). En: F. Sánchez-Herrera (ed.). *Terceras Jornadas Científicas del Parque Natural de Peñalara y del Valle de El Paular*. Rascafría.
- Del Moral, J. C. y De la Puente, J. 2005. Buitre negro *Aegypius monachus*. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org>.
- Delibes, M. 1980. El lince ibérico. Ecología y comportamientos alimenticios en el Coto de Doñana, Huelva. *Doñana Acta Vertebrata* 7 (3): 1-128.
- Delibes, M. e Hiraldo, F. 1981. The rabbit as a prey in the Iberian Mediterranean ecosystem. En: *Proceedings of the World Lagomorph Conference*. University of Guelph. Guelph.
- DGMA. 2002. *Recomendaciones para la mejora de las poblaciones de conejo silvestre*. Dirección General de Medio Ambiente. Junta de Extremadura. Mérida.
- Díaz, M., González, E., Muñoz-Pulido, R. y Naveso, M. A. 1995. Habitat selection patterns of common cranes *Grus grus* wintering in holm oak *Quercus ilex* dehesas of central Spain: effects of human management. *Biological Conservation* 75: 119-123.
- Díaz, M., Campos, P. y Pulido, F. J. 1997. The Spanish Dehesas: a diversity in land use and Wildlife. En: Pain, D.J., Pienkowski, M.W. (eds.). *Farming and Birds in Europe: The Common Agricultural Policy and Its Complications for Bird Conservation*. Academic Press, London.
- Díaz, M. y Martín, P. 1998. Habitat selectivity in wintering wood pigeon *Columba palumbus* in holm oak dehesas of central Spain. *Gibier Faune Sauvage* 15 (2): 167-181.
- Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Subdirección General de Conservación de la Biodiversidad. 2003. *Propuesta de valoración económica del proyecto de Real Decreto para actuaciones sobre infraestructuras eléctricas con influencia para la avifauna*. Informe inédito.
- Dobado, P., Ruiz, J. M. y Arenas, R. 2004. *Present status of the black vulture Aegypius monachus in the mountain ranges of Hornachuelos (South Spain)*. Póster presentado en el Symposium Internacional sobre Buitre negro. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.
- Dobado, P. y Arenas, R. 2006. El veneno acorralla al buitre negro en Hornachuelos. *Quercus* 241: 10-15.
- Donázar, J. A. y Ceballos, O. 1990. Post-fledging dependence period and development of flight and foraging behaviour in the Egyptian Vulture *Neophron percnopterus*. *Ardea* 78: 387-394.
- Donázar, J. A. 1992. Muladares y basureros en la biología y conservación de las aves en España. *Ardeola* 39(2): 29-40.
- Donázar, J. A. 1993. *Los Buitres Ibéricos. Biología y Conservación*. Ed. J. M. Reyero. Madrid.
- Donázar, J. A., Hiraldo, F. y Bustamante, J. 1993. Factors influencing nest site selection, breeding density and breeding success in the bearded vulture (*Gypaetus barbatus*). *Journal of Applied Ecology* 30: 504-514.
- 2002. *Tendencias recientes de la población española de buitre negro: evaluación de factores limitantes y medidas de conservación*. En: F. Sánchez-Herrera (ed). *Terceras Jornadas Científicas del Parque Natural de Peñalara y del Valle de El Paular*. Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. Rascafría.
- Donázar, J. A., Blanco, G., Hiraldo, F., Soto-Largo, E. y Oria, J. 2002. Effects of forestry and other land-use practices on the conservation of cinereous vultures. *Ecological Applications* 12: 1445-1456.
- Donázar, J. A., Palacios, C. J., Gangoso, L., Ceballos, O., González, M. J. e Hiraldo, F. 2002. Conservation status and limiting factors in the endangered population of Egyptian vulture (*Neophron percnopterus*) in the Canary Islands. *Biological Conservation* 107: 89-97.

- Donázar, J. A. 2004. Alimoche común *Neophron percnopterus*. En: Madroño, A., González, C. y Atienza, J. C. (eds.). *Libro rojo de las aves de España*. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Drewitt, A. y Langston, R. H. W. 2006. Assessing the impacts of wind farms on birds. *Wind, Fire and Water: Renewable Energy and Birds*. *Ibis* 148 (1): 29-42.
- Elith, J. 2000. Quantitative methods for modeling species habitat: comparative performance and an application to Australian plants. En: Ferson, S. & Burgman, M. (ed.). *Quantitative Methods for Conservation Biology*. Springer. New York.
- Elith, J., Graham, C.H., Anderson, R.P., Dudik, M., Ferrier, S., Guisan, A., Hijmans, R.J., Huettmann, F., Leathwick, J.R., Lehmann, A., Li, J., Lohmann, L.G., Loiselle, B.A., Manion, G., Moritz, C., Nakamura, M., Nakazawa, Y., Overton, J.McC., Peterson, A.T., Phillips, S.J., Richardson, K., Scachetti-Pereira, R., Schapira, R.E., Soberón, J., Williams, S., Wisz, M.S., Zimmermann, N.E. 2006. Novel methods improve prediction of species' distributions from occurrence data. *Ecography* 29: 129-151.
- Elliot, G. D., y Avery, M. I. 1991. A review of reports of Buzzard persecutions 1975-89. *Bird Study* 38: 52-56.
- Elliot, J. E., Langelier, K. M., Mineau, P. y Wilson, L. K. 1996. **Poisoning of Bald eagles and Red-tailed hawks** by carbofuran and fensulphothion in the Fraser Delta of British Columbia, Canada. *Journal of Wildlife Disease* 32: 486-491.
- Eurosite. 1999. *Manual de Planes de Gestión*. Fundación Territori i Paisatge. Caixa Catalunya.
- Fandos, P., Martínez, T. y Palacios, F. 1987. Estudio sobre la alimentación del corzo *Capreolus capreolus* L. 1758, en España. *Ecología* 1: 161-186
- Farfán, M. A., Guerrero, J. C., Real, R., Barbosa, A. M. y Vargas, M. 2002. Caracterización del aprovechamiento cinegético de los mamíferos en Andalucía. *Galemys* 16 (1): 41-59.
- Fargallo, J. A., Blanco, G. y Soto-Largo, E. 1998. Forest management effects on nesting habitat selected by eurasian black vultures *Aegypius monachus* in central Spain. *Journal of Raptor Research* 32 (3): 202-207.
- Fedriani, J. M., Palomares, F. y Delibes, M. 1999. Niche relations among three sympatric Mediterranean carnivores. *Oecologia* 121: 138-148.
- Fedriani, J. M., Fuller, T. K., Sauvajot, R. M. y York, E. C. 2000. Competition and intraguild predation among three sympatric carnivores. *Oecologia* 125 (2): 258-270.
- Fenner, F. y Ross J. 1994. Myxomatosis. En: Thompson H.V. & Kim C.M. (eds.). *The European rabbit. The history and biology of a successful colonizer*. Oxford University Press. Oxford.
- Fernández, C. y Azkona, P. 2002. *Tendidos eléctricos y Medio Ambiente en Navarra*. Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Navarra. Pamplona.
- Fernández-Llario, P. y Mateos-Quesada, P. 2003. Population structure of the wild boar *Sus scrofa* in two Mediterranean habitats in the western Iberian peninsula. *Folia Zool.* 52 (2): 143-148.
- Fernández-Olalla, M. 2006. *Efecto del ramoneo del ciervo Cervus elaphus sobre el matorral mediterráneo. Categorías de preferencia e influencia de la carga cinegética*. Proyecto Final de Carrera. Escuela Técnica de Ingenieros de Montes. Universidad Politécnica de Madrid.
- Ferrer, M. 1993. Juvenile dispersal behaviour and natal philopatry of a long lived raptor, the Spanish Imperial Eagle. *Ibis* 135: 132-138.
- Ferrer, M. y Janss, G. F. E. 1999. *Aves y líneas eléctricas: colisión, electrocución y nidificación*. Ed. Quercus. Madrid.
- Ferrera, E. M., Olea, L., Viguera, J. y Poblaciones, M. 2005. Mejora de pastos naturales con aplicación de diversas fuentes fosfóricas y yeso en suelos de rañas y rañizos en el este de Extremadura. En: B. de la Roza, A. Martínez, y. A. Carballal (eds.). *XLV Reunión Científica de la S.E.E.P. SERIDA*. Gijón, Asturias.
- Ferreras, P. 2003. *Homologación de métodos de control de predadores en Castilla-La Mancha: bases científicas*. Informe inédito. IREC-CSIC-UCLM-JCCM. Toledo.
- Fielding, A.H., Bell, J.F. 1997. A review of methods for the assessment of prediction errors in conservation presence/absence models. *Environmental Conservation* 24: 38-49.

Bibliografía

- Fisher, I. J., Pain, D. J. y Thomas, V. G. 2006. A review of lead poisoning from ammunition sources in terrestrial birds. *Biological Conservation* 131: 421-432.
- Fleming, P. J. S. 1996. Ground-placed baits for the control of wild dogs: evaluation of a replacement-baiting strategy in north-eastern New South Wales. *Wildlife Research* 23 (6): 729-740.
- Fleming, P. J. S., Allen, L. R., Lapidge, S. J., Robley, A., Saunders, G. R. y Thompson, P. C. 2006. A strategic approach to mitigating the impacts of wild canids: proposed activities of the invasive animals cooperative research centre. *Australian Journal of Experimental Agriculture* 46: 753-762.
- Forrester, N. L., Trout, R. C. y Gould, E. A. 2006. Benign circulation of rabbit haemorrhagic disease virus on Lambay Island, Eire. *Virology* 12.
- Forsman, D. 1999. *The Raptors of Europe and Middle East. A Handbook of field identification*. London. T & AD Poyser. London.
- Frumkin, R. 1994. Intraspecific brood-parasitism and dispersal in fledgling Sparrowhawks *Accipiter nisus*. *Ibis* 136: 426-433.
- Fry, D. M., Wilson, B. W., Ottum, N. D., Yamamoto, J. T., Stein, R. W., Seiber, J. N., McChesney, M. M. y Richardson, E. M. 1998. Radiotelemetry and GIS computer modelling as tools for analysis of exposure to organophosphate pesticides in Red-tailed Hawks. En: Brewer, L. y Fagerstone, K. (eds.). *Radiotelemetry applications for wildlife toxicology fields studies*. SETAC Press. Pensacola. Florida.
- Fundación Biodiversidad. 2003. *Manual para el manejo de animales heridos*. Fundación Biodiversidad. Madrid.
- Fundación CBD-Hábitat. 2005a. *Conservación del águila imperial, buitre negro y cigüeña negra. Proyecto LIFE 03/NAT/E/0050*. Informe inédito.
- 2005b. *La situación legal del depósito de subproductos animales y su relación con la alimentación de las aves rapaces necrófagas*. Informe inédito (http://www.cbd-habitat.com/contenidos/lifeaves/informe_alimentacion_necrofagas_CE.pdf).
- 2006a. *Informe final de resultados proyecto Life 02/NAT/E/8617 Conservación del lince ibérico en Montes de Toledo-Guadalupe*. Informe inédito.
- 2006b. *Informe final. Proyecto Conservación del Lince ibérico en Sierra Morena Oriental*. Informe inédito.
- 2006c. *Tercer informe anual de resultados proyecto LIFE03/NAT/E/00050 Conservación del Águila imperial, Buitre negro y Cigüeña negra*. Informe inédito.
- 2006d. *Revisión de tendidos eléctricos y evaluación de mortalidad en aves, en las áreas del proyecto LIFE 03/NAT/E/0050*. Informe inédito.
- 2007. *Sugerencias para la modificación técnica de los modelos de apoyos peligrosos de líneas eléctricas*. Informe inédito.
- Fundación Santander Central Hispano. 2005. *Manuales de desarrollo sostenible. Gestión y Restauración de humedales, I*. Fundación Santander Central Hispano. Madrid.
- Fungesma. 2001. *Buenas prácticas cinegéticas*. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
- Galán, R., de Andrés, A. J. y Segovia, C. 1996. Interferencias de las actividades forestales con la conservación del buitre negro (*Aegypius monachus*) en Sierra Pelada (Huelva, SW Spain). *Ecología* 10: 437-446.
- 1997. *Problems for the conservation and measures for the protection of the nesting population of cinereous vultures Aegypius monachus in Sierra Pelada (Huelva, SW Spain)*. En: Chancellor, R. D., Meyburg, B. U. y Ferrero, J.J. (eds.). *Holarctic Birds of Prey*. ADENEX-WWGBP.
- 1998. *Effects of forest fires (1984-1992) on the cinereous vulture Aegypius monachus reproduction in Sierra Pelada (Huelva, SW Spain)*. En: Meyburg, B. U., Chancellor, R. D. y Ferrero, J.J. (eds.). *Holarctic Birds of Prey*. ADENEX-WWGBP.
- Galán, R. 2001. *El buitre negro en Andalucía*. Resumen de ponencia presentado en las Jornadas sobre Buitres. UNED. Ávila.
- 2002. *Situación del Buitre Negro (Aegypius monachus) en Andalucía*. *Andalus. Monográfico Buitre Negro*. Asociación Andalus.

- Galán, R., Segovia, C., Martínez, M. A., Alés, E., Coronilla, R. y Barrera, M. 2003. La colonia de buitre negro de Sierra Pelada. *Quercus* 211: 27-33.
- Galán, R. y Segovia, C. 2004. *Medidas para la conservación del buitre negro en Huelva, S. O. de España*. Póster presentado en el Symposium Internacional sobre Buitre negro. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.
- Galushin, V., Katzner, T. y Sklyarenko, S. 2004. *Black vulture in Russia and Kazakhstan*. Symposium Internacional sobre buitre negro. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.
- García, J. F. 2003. *Revisión de las actuaciones para el fomento de las poblaciones de conejo. 1ª informe anual*. Informe inédito. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- 2005. *Manual técnico para el fomento de las poblaciones de conejo*. Informe inédito. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- García, P. 1996. *Contribución a la historia de la trashumancia*. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- García, S. 2003. *Guía metodológica para la elaboración de Planes de Gestión de los Lugares Natura 2000 en Navarra*. Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra. Pamplona.
- Garrido, S. y Baena, A. 2003. Beneficios e impactos ambientales asociados a las centrales de ciclo combinado y parques eólicos. *Cuadernos de Energía* 1: 5-9.
- Garzón, J. 1968. Las rapaces y otras aves de la Sierra de Gata. *Ardeola* 14: 97-130.
- 1974. Contribución al estudio del estatus, alimentación y conservación de las falconiformes en España Central. *Ardeola* 19: 279-330.
- 1977. Importancia ecológica de la comarca de Torrejón (Cáceres) y necesidad urgente de su protección. *Boletín Circular de la Sociedad Española de Ornitología* 54: 11-17.
- 1997. La importancia de la cultura agraria para la conservación de las aves carroñeras. *Actas del II Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras*. Cañizares-Solán de Cabras.
- Garzón, P. 1991. *Biología y ecología del jabalí Sus scrofa en el Parque Natural de Monfragüe*. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid.
- Gavashelishvili, A., McGrady, M.J., Javakhishvili, Z. 2006. Planning the conservation of the breeding population of cinereous vultures *Aegypius monachus* in the Republic of Georgia. *Oryx* 40:1-8.
- Gea-Izquierdo, G., Muñoz, J. y San Miguel, A. 2005. Spatial distribution and ecology of a fan european rabbit warren system included within an iberian imperial eagle nesting area in central Spain. *Journal of Animal Ecology* 50: 269-281.
- Gentil, A. y Ventanas, A. 1998. Proyecto de conservación del Buitre Negro *Aegypius monachus* en la Sierra de Gata (Cáceres). En: B. U. Meyburg, R. D. Chancellor y J. J. Ferrero (eds.). *Holarctic Birds of Prey*, pp. 223-229. WWGBP-ADENEX.
- GIIFS (Grupo de Investigación Internacional sobre la Fauna Silvestre). 2004. *Estudio sobre la invernada de la Paloma Torcaz en la Península Ibérica. Temporada 2003-2004*. Informe inédito.
- Gil, L., Gordo, J., Alía, R., Catalán, G. y Pardos, J. A. 1990. *Pinus pinaster* Aitón en el paisaje vegetal de la península Ibérica. *Ecología* 1: 527-540.
- Glen, A. S., y Dickman C. R. 2005. Complex interactions among mammalian carnivores in Australia, and their implications for wildlife management. *Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society* 80 (3): 387-401.
- Glutz von Blotzheim, U., Bauer, K. y Bezzel, E. 1971. *Habdbuch der Vögel Mitteleuropas. Vol. 4: Falconiformes*. Frankfurt Am Main: Akademische Verlagsgesellschaft.
- Godino, A., Casas, A., Duque, A. y Bautista, F. 2002. The colony of Eurasian Black Vultures *Aegypius monachus* in the Natural Park of Sierra de Andújar, Jaén, Spain. *Vulture News* 47: 11-17.
- Gómez-Limón, J. y De Lucio, J. V. Changes in use and landscape preferences on the agricultural-livestock landscapes of the central Iberian Peninsula (Madrid, Spain). *Landscape and Urban Planning* 44 (4): 165-175.
- González, L. M., González, J. L., Garzón, J. y Heredia, B. 1986. Estatus y evolución de la población de buitre negro en la Península Ibérica (1972-1986). En: *Resúmenes de la V Conferencia Internacional sobre Rapaces Mediterráneas*. Evora.

Bibliografía

- González, L. M. 1990. Situación de las poblaciones de águila imperial y buitre negro en España. *Quercus* 58: 16-22.
- 1991. *Historia natural del águila imperial ibérica Aquila adalberti Brehm 1861*. ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- González, L. M. y Oria, J. 2004. Águila imperial *Aquila adalberti*. En: Madroño, A., González, C. y Atienza, J. C. *Libro rojo de las aves de España*. SEO/BirdLife-Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- González, L. M. y San Miguel, A. (coord.). 2004. *Manual de buenas prácticas de gestión en fincas de monte mediterráneo de la Red Natura 2000*. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- González, L. M., Arroyo, B., Margalida, A., Sánchez, R. y Oria, J. 2006. Effect of human activities on the behaviour of breeding Spanish imperial eagles (*Aquila adalberti*): management implications for the conservation of a threatened species. *Animal Conservation* 9: 85-93.
- González, R. 2004. A case study of the change in the management of the game resources: the history of the game farming of the red-legged partridge in Spain. *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros* 204: 179-203.
- González-Bernáldez, F. 1991. Ecological consequences of the abandonment of traditional land use systems in central Spain. *Cahiers Options Méditerranéés* 15: 23-29.
- González del Tánago, A., Musiera, E., Ratera, C., Rego, S. y Serrano L. 1984. *Mejora de pastos en secanos semiáridos de suelos ácidos*. Ed. INIA/SEA/ADG.
- Goodchild, M.F., Parks, B.O., Steyaert, L.T. (eds.). 1996. *Environmental Modelling with GIS*. Oxford University Press. New York.
- Gortázar, C., Villafuerte R. y Martín P. 2000. Success of traditional restocking of red-legged partridge for hunting purposes in areas of low density of northeast Spain Aragon. *European Journal of Wildlife Research* 46(1): 23-30.
- Gortázar, C., Villafuerte, R., Escudero, M. A. y Marco, J. 2002. Post-breeding densities of the Red-legged Partridge *Alectoris rufa* in agrosystems: a large-scale study in Aragón, Northeastern Spain. *Zeitschrift für Jagdwissenschaft* 48 (2): 94-101.
- Gortázar, C. 2005. Enfermedades del jabalí. *Accazadores* 10: 68-71.
- Gortázar, C., Acevedo, P., Ruiz-Fons, F. & J. Vicente. 2006. Disease Risks and Overabundance of Game Species. *European Journal of Wildlife Research* 52 (2): 81-87.
- Granados, J. E., Soriguer, R., Pérez, J. M., Fandos, P. y García-Santiago, J. 2002. Cabra montés *Capra pyrenaica*. En: L. J. Palomo y J. Gisbert (eds.). *Atlas de los Mamíferos terrestres de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. SECEM-SECEMU. Madrid.
- Green, R. E., Newton, I., Shultz, S., Cunningham, A. A., Gilbert, M., Pain, D. J. y Prakash, V. 2004. Diclofenac poisoning as a cause of vulture population declines across the Indian subcontinent. *Journal of Applied Ecology* 41: 793-800.
- GREFA. 2004. Estudio de la dispersión y áreas de alimentación del buitre negro. *Symposium Internacional sobre buitre negro*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.
- Grier, J. W. 1974. Reproduction, organochlorines, and mercury in northwestern Ontario bald eagles. *Canadian Field-Nat.* 88: 469-475.
- Guerrero, A. 1992. *Cultivos herbáceos extensivos*. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
- Guisan, A., Zimmermann, N.E. 2000. Predictive habitat distribution models in ecology. *Ecological Modelling* 135: 147-186.
- Guisan, A., Edwards, T.C., Hastie, T. 2002. Generalized linear and generalized additive models in studies of species distributions: setting the scene. *Ecological Modelling* 157: 89-100.
- Guzmán, J. y Jiménez, J. 1998. Alimentación del buitre negro *Aegyptius monachus* durante los períodos reproductor y post-reproductor en el Parque Nacional de Cabañeros. En: Chancellor, R. D., Meyburg, B. U. y Ferrero, J. J. (eds.). *Holarctic Birds of Prey*. WWGBP-ADENEX.
- Hayward, J. S. 1961. The ability of rabbit to survive conditions of water restriction. *CSIRO Wildlife Research* 6: 60-175.

- Helander, B., Olsson, A., Bignert, A., Asplund, L. y Litzen, K. 2002. The role of DDE, PCB, coplanar PCB and eggshell parameters for reproduction in the White-tailed Sea Eagle (*Haliaeetus albicilla*) in Sweden. *Ambio* 31: 386-403.
- Henny, C. J., Kolbe, E. J., Hill, E. F. y Blus, L. J. 1987. Case histories of Bald eagles and other raptors killed by organophosphorus insecticides topically applied to livestock. *Journal of Wildlife Disease* 23: 292-295.
- Heredia, B. (comp.). 1996. Action Plan for the cinereous vulture *Aegypius monachus* in Europe. En: Heredia, B., Rose, L. y Painter, M. (eds.). *Globally threatened birds in Europe: action plans*. Council of Europe Publishing, Strasbourg.
- Hernández, L. M., Rico, M. C., González, M. A., Hernán, M. A. y Fernández, M. A. 1986. Presence and time trends of organochlorine pollutants and heavy metals in eggs of predatory birds of Spain. *Journal Field Ornithology* 57: 270-282.
- Hernández, M. 2003. El futuro del quebrantahuesos en los Pirineos. *Quercus* 203: 24-29.
- 2006. *Informe anual sobre el grado de intoxicación de las especies del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas*. Informe inédito. TRAGSA. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- Herranz, J. 2000. *Efectos de la depredación y del control de predadores sobre la caza menor en Castilla-La Mancha*. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid.
- Herrera, C. M. 1974. Trophic diversity of the Barn Owl *Tyto alba* in continental western Europe owls. *Ornis Scandinavica* 7: 29-41.
- Herrero, J. 2004. *Adaptación funcional del jabalí Sus scrofa a un ecosistema forestal y a un sistema agrario intensivo en Aragón*. Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Zaragoza.
- Heydon, M. J. y Reynolds J. C. 2000. Fox (*Vulpes vulpes*) management in three contrasting regions of Britain, in relation to agricultural and sporting interests. *Journal of Zoology* 251 (2): 237-252.
- Hiraldó, F. 1974. Colonias de cría y censo de los buitres negros *Aegypius monachus* en España. *Naturalia Hispanica* 2. ICONA. Madrid.
- 1976. Diet of black vulture *Aegypius monachus* in the Iberian Peninsula. *Doñana, Acta Vertebrata* 3: 19-31.
- 1977. *El buitre negro Aegypius monachus en la Península Ibérica. Población, biología general, uso de recursos e interacciones con otras aves*. Tesis doctoral. Universidad de Sevilla.
- Hiraldó, F., Delibes, M. y Calderón, J. 1979. *El quebrantahuesos Gypaetus barbatus (L.)*. Monografías 22. ICONA. Madrid
- Hiraldó, F. 1983. Breeding biology of the Cinereous Vulture. En: Wilbur, S.R., Jackson, J. A. (eds.). *Vulture Biology and Management*. University of California Press. Berkeley.
- Hiraldó, F. y Donazar, J. A. 1990. Foraging time in the cinereous vulture *Aegypius monachus*: seasonal and local variations and influence of weather. *Bird Study* 37: 128-132.
- Höfle, U., Blanco, J. M. y Kaleta, E. F. 2001. Neutralising antibodies against infectious bursal disease virus in sera of free-living and captive birds of prey from central Spain (preliminary results). *Proceedings Symposium on Infectious Bursal Disease Virus and Chicken Anemia Virus*.
- 2002. Sero-prevalence of Avian Paramyxovirus 1, 2, and 3 in Captive and Free-Living Birds of Prey in Spain - Implications for Conservation and Management of Wild and Captive Populations. *Annals New York Academy of Sciences* 969: 213-216.
- Hooper, M. J., Detrich, P. J., Weisskopf, C. P. y Wilson, B. W. 1989. Organophosphorus insecticide exposure in hawks inhabiting orchards during winter dormant-spraying. *Bulletin Environmental Toxicology* 42: 651-659.
- Houston, D. C. 1974. Food searching in griffon vultures. *East African Wildlife Journal* 12: 63-77.
- 1979. The adaptations of scavengers. En A.R.E. Sinclair y M. Northon-Griffiths (eds.): *Serengeti: Dynamics of an Ecosystem*. Chicago UP.
- 1986. Scavenging efficiency of Turkey Vultures in a tropical forest. *The Condor* 88: 318-323.
- Huberty, C.J. 1994. *Applied Discriminant Analysis*. Ed. Wiley Interscience. New York.
- Hudson, P., Dobson, A. P. y Newborn, D. 1992. Do parasites make prey vulnerable to predation? Red grouse and parasites. *Journal of Animal Ecology* 61: 681-692.

Bibliografía

- Instituto Nacional de Estadística. 2006. *Anuario Estadístico de España on line (INEBASE)*. (http://www.ine.es/inebase/menu6_agr.htm).
- IREC (CSIC). 2003. *Homologación de métodos de control de predadores en Castilla-La Mancha: bases científicas*. Informe final. IREC. Ciudad Real.
- IUCN. 1998. *Guidelines for Re-introductions*. (Gland) Switzerland.
- IUCN. 2006. *The IUCN red list of threatened species*. (<http://www.iucnredlist.org/search/details.php/544/dist>).
- Izco, J. 1984. *Madrid Verde*. Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios. Madrid.
- Jaksic, F. M. y Martín C. 1979. Comparative food habits of Bubo owls in Mediterranean-type ecosystems. *The Condor* 86: 288-296.
- Jaksic, F. M. y Soriguer, R. C. 1981. Predation upon the European rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) in Mediterranean habitats of Chile and Spain: a comparative analysis. *Journal of Animal Ecology* 50: 269-281.
- Jefatura de Estado. 2001. Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. *Boletín Oficial del Estado* 111: 16607-16616.
- Ji, W. y Jeske, C. 2000. Spatial modelling of the geographic distribution of wildlife populations: a case study in the lower Mississippi River region. *Ecological Modelling* 132: 95-104.
- Jiménez, F. J., Gordo, F. J. y González, A. 2006. *Manual sobre criterios de gestión forestal compatibles con la conservación de las especies de aves y quirópteros asociados a hábitats forestales*. Junta de Castilla y León.
- Jiménez, J. 1990a. *Estudio de las poblaciones de buitre negro Aegypius monachus y águila imperial Aquila adalberti en la provincia de Ciudad Real. Descripción y problemática*. Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Toledo.
- 1990b. *Estudio del funcionamiento de comederos para el buitre negro en el Parque Natural de Cabañeros*. En: *Actas del I Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras*. Aedenat-Coda. Madrid.
- 2002. *Elaboración de un modelo de hábitat de reproducción del buitre negro Aegypius monachus en los Montes de Toledo*. En: Torralvo, C. (ed.). *Anuario Ornitológico de Ciudad Real 1995-2001*. SEO/Ciudad Real. Ciudad Real.
- 2005. *Las poblaciones de aves carroñeras en el Parque Nacional de Cabañeros (Castilla-La Mancha)*. En: *Actas del 3º Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras*. Diputación Provincial de Guadalajara. Guadalajara.
- 2006. *Habitat modelling for black vulture Aegypius monachus in Cabañeros National Park*. En: Houston, D. C. y Piper, S. E. (eds.). *Proceedings of the International Conference on Conservation and Management of Vulture Populations*. 14-16 November 2005, Thessaloniki, Greece. Natural History Museum of Crete & WWF Greece.
- Jovani, R. y Tella, J. L. 2004. Age-related environmental sensitivity and weather mediated nestling mortality in white storks *Ciconia ciconia*. *Ecography* 27: 611-618.
- Junta de Andalucía. 1989. *Plan Forestal Andaluz*. Agencia de Medio Ambiente. Sevilla.
- Kendeigh, S. C., Dolnik, V. R. y Gavrillov, V. M. 1977. Avian energetics. En: Pinowski, J. & Kendeigh, S.C. (eds.). *Granivorous birds in ecosystems*. Cambridge University Press. Cambridge.
- König, C. 1983. Interspecific and intraespecific competition for food among Old World vultures. En: Wilbur, S. R. y Jackson, J. A. (eds.). *Vulture biology and management*. University of California Press. Berkeley.
- Krebs, C. J. 1996. Population cycles revisited. *Journal of Mammalogy* 77(1): 8-24.
- Labrador, J., Porcuna, J. L. y Bello, A. 2002. *Manual de agricultura y ganadería ecológica*. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
- Langston, R. H. W. y Pullan, J. D. 2002. *Windfarms and birds: an analysis of the effects of windfarms on birds, and guidance of environmental assessment criteria and site selection issues*. Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats. Strasbourg (http://www.coe.int/t/e/Cultural_Cooperation/Environment/Nature_and_biological_diversity/Nature_protection/sc23_infl2e.pdf).

- Lasiewski, R. C. y Dawson, W. R. 1967. A re-examination of the relation between standard metabolic rate and body weight in birds. *Condor* 69: 13-23.
- Lekuona, J. M. 2001. *Uso del espacio por la avifauna y control de la mortalidad de aves y murciélagos en los parques eólicos de Navarra durante un ciclo anual*. Informe no publicado. Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. Gobierno de Navarra. Pamplona.
- Lekuona, J. M. 2002. *Relaciones entre vuelos de grandes rapaces, el muladar de Robres y los parques eólicos de Huesca: propuestas de alternativas de actuación*. Informe inédito. Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.
- Letty, J., Aubineau J., Marchandean S. y Claubert, J. 2003. Effect of translocation on survival in wild rabbit (*Oryctolagus cuniculus*). *Mammalian Biology* 68: 250-255.
- Lierz, M., Schmidt, R., Brunnberg L., Runge M. 2000. Isolation of Mycoplasma meleagridis from free-ranging birds of prey in Germany. *J. Vet Med B.* 47: 63-67.
- Little, S. E., Davidson W. R., Rakich P. M., Nixon T. L., Bounous D. I. y Nettles V. F. 1998. Responses of red foxes to first and second infection with *Sarcoptes scabiei*. *Journal of wildlife diseases* 34(3): 600.
- Lloret, F. 2004. Régimen de incendios y regeneración. En: Valladares, F. *Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante*. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- Lockley, R. M. 1965. *The Private Life of the Rabbit*. London.
- López, B. y Ferreras, P. 2003. *Repensando el control de depredadores*. IPAE-IREC. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura.
- López-González, G. 1982. *La guía INCAFO de los árboles y arbustos de la península Ibérica*. INCAFO. Madrid.
- Luque, E., Martos, M. J., Dobado, P. M. y Arenas, R. 2004. *Situación actual y evolución reciente del núcleo de buitre negro Aegypius monachus de la Sierra Norte, Sevilla*. Póster presentado en el Symposium Internacional sobre Buitre negro. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.
- Machado, A. 1997. *Guidelines for action plans for animal species: planning recovery*. Council of Europe. Nature and environment, 92.
- Mackey, B.G., Lindenmayer, B. 2001. Towards a hierarchical framework for modelling the spatial distribution of animals. *Journal of Biogeography* 28:1147-1166.
- Madrigal, A. 1995. *Ordenación de montes arbolados*. Serie técnica. ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid
- Madroño, A., González, C. y Atienza, J. C. (eds.). 2004. *Libro rojo de las aves de España*. SEO/BirdLife-Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.
- Maldonado, A., Olea, L., Viguera, J. y Poblaciones, M. 2004. Efecto de la aplicación de diferentes fuentes de fertilización fosfórica sobre suelos de pizarra en dehesas y pastizales del S.O. de España. En: García, B., García, A., Vázquez de Aldana, B. R. y Zabalgogezcoa, I. (eds.). *XLIV Reunión científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos*. SEEP. Salamanca.
- Manel, S., Dias, J. M., Buckton, S. T., Ormerod, S. J. 1999. Alternative methods for predicting species distribution: An illustration with Himalayan river birds. *Journal of Applied Ecology* 36: 734-747.
- Manly, B. F. J., McDonald, L. L., Thomas, D. L. 1993. *Resource selection by animals. Statistical design and analysis for field studies*. Chapman & Hall. Londres.
- Marboutin, E., Bray Y., Peroux R., Mauvy B. y Lartiges A. 2003. **Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates**. *Journal of Applied Ecology* 40 (3): 580-591.
- Marchandean, S. y Boucraut C. 1999. Epidemiology of myxomatosis and calicivirus related to RVHD in a free-living population of European rabbit (*Oryctolagus cuniculus*). *Gibier Faune Sauvage* 16: 65-80.
- Margalida, A., Carrete, M. y Donazar, J. A. 2007. Cae la productividad del Quebrantahuesos debido al empaquetamiento de sus territorios. *Quercus* 253: 14-20.

Bibliografía

- Marks, C. A., Jalkanen, L., Savolainen, R. y Short, R. V. 2001. Control of red fox (*Vulpes vulpes*) fertility with cabergoline: dose response and timing of intervention. *Reproduction* 122: 147-154.
- Martí, R., Del Moral, J. C. y Refoyo, P. 1999. Programas de seguimiento de especies singulares: el buitre negro en la ZEPA Alto Lozoya. En: Navalón, L. y Prieto, D. *Actas de los Primeros Encuentros Científicos del Parque Natural de Peñalara y del Valle del Paular*. Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. Madrid.
- Martí, R. 2003. Buitre leonado, *Gyps fulvus*. En: Martí, R. y del Moral, J. C. (eds.). *Atlas de las Aves reproductoras de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- Martí, R. y Del Moral, J. C. (eds.). 2003. *Atlas de las Aves Reproductoras de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SEO/BirdLife. Madrid.
- Martín, J. y Fajardo, I. 2006. El color de la cabeza lo dice todo. *Quercus* 241: 16-18.
- Martínez, J. y Jurado, J. J. 2003. Modelización de la productividad de un coto de caza menor. *Itea* 99 (2): 121-129.
- Martínez, J., Criado-Fornelio, A., Lanzarot, P., Fernández-García, M., Rodríguez-Cabeiro, F. y Merino, S. 2004. A new pentastomid from the black vulture. *Journal of Parasitology* 90: 1103-1105.
- Martínez, J. A. y Zuberogoitia, I. 2001. The response of the Eagle Owl (*Bubo bubo*) to an outbreak of the rabbit haemorrhagic disease. *Journal of Ornithology* 142 (2): 204-211.
- Marzluff, J. M., Knick, S. T., Vekasy, M. S., Schueck, L. S. y Zarriello, T. J. 1997. Spatial use and habitat selection of Golden Eagles in southwestern Idaho. *The Auk* 114: 673-687.
- Mateo, J. M. 1996. *Manual de prácticas y actuaciones agroambientales*. Ed. Agrícola Española-Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
- Mayer, P. M. y Ryan, M. R. 1991. Electric fences reduce mammalian predation on piping plover nest and chicks. *Wildlife Society Bulletin* 19: 59-63
- McCullagh, P., Nelder, J.A. 1989. *Generalized linear models*. Chapman & Hall/CRC. London.
- Meffe, G. K. y Carroll, C. R. 1994. *Principles of Conservation Biology*. Sinauer Associates, Inc. Massachusetts.
- Mineau, P., Fletcher, M. R., Glaser, L. C., Thomas, N. J., Brassard, C., Wilson, L. K., Elliott, J. E., Lyon, L. A., Henny, C. J., Bollinger, T. y Porter, S. L. 1999. Poisoning of raptors with organophosphorus and carbamate pesticides with emphasis in Canada, US and UK. *Journal of Raptor Research* 33: 1-37.
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2002. *Hechos y cifras del sector agro-alimentario y del medio rural español*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría Técnica. Madrid.
- 2006. *Anuario de estadística agroalimentaria, 2004*. Centro de Publicaciones. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- 2006b. *Legislación sobre Sanidad Animal. On line*. (<http://rasve.mapa.es/Publica/InformacionGeneral/Legislacion/legislacion.asp>).
- 2006c. *Encuesta de sacrificio ganadero, año 2004*. <http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/sacrificio/encuesta.asp>.
- Ministerio de Medio Ambiente. 1999. *Estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- 2006. *Mapa Forestal de España, Escala 1:50.000. Año 2004. CD-Rom*. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- Ministerio de la Presidencia. 2002. Real Decreto 1098/2002 de 25 de octubre por el que se regula la alimentación de aves rapaces necrófagas con determinados animales muertos y sus productos. *Boletín Oficial del Estado* 262: 38608-38610.
- 2003. Real Decreto 1429/2003 de 21 de noviembre por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano. *Boletín Oficial del Estado* 280: 41466-41474.
- 2007. Real Decreto 664/2007 de 25 de mayo por el que se regula la alimentación de aves rapaces necrófagas con subproductos animales no destinados a consumo humano. *Boletín Oficial del Estado* 134: 24374-24377.

- Moleón, M., Díaz, M. A., Barea, J. M. y Gil, J. M. 2001. Diet of eurasian black vulture *Aegypius monachus* in Andujar Natural Park, SE Spain. En: *Resúmenes del 4º Eurasian congress on raptors*. Estación Biológica de Doñana-Raptor Research Foundation. Sevilla.
- Molsher, R. L. 1999. *The ecology of feral cats, Felis catus, in open forest in New South Wales: interactions with food resources and foxes*. Tesis Doctoral. Universidad de Sidney.
- Montoya, J. M. 1993. *Encinas y encinares*. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
- 1996. *La poda de los árboles forestales*. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
- 1999. *El ciervo y el monte: manejo y conservación*. Fundación Conde del Valle de Salazar. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
- Morán, R., Costillo, E., Sánchez, J. M., Corbacho, C., Villegas, A. 2005. Aplicaciones de la cartografía predictiva en la gestión y conservación de especies amenazadas: lugares potenciales de reproducción del Buitre negro (*Aegypius monachus*) en Extremadura. En: J. M. López Caballero (ed.). *Conservación de la Naturaleza en Extremadura. Comunicaciones en Jornadas y Congresos 2002-2004*. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. Mérida.
- Morán-López, R., Sánchez Guzmán, J. M., Costillo Borrego, E., Corbacho Amado, C. 2005. Effectiveness of spatial partitioning and correcting for autocorrelation on the capacity of predictive modelling to prioritize areas for conservation: an example using the cinereous vulture (*Aegypius monachus*). En: *Predictive Modelling of Species Distribution. New Tools for the XXI Century*. Universidad Internacional de Andalucía Baeza.
- Morán-López, R., Sánchez, J. M., Costillo, E. y Villegas, A. 2006a. Nest-site selection of endangered cinereous vulture *Aegypius monachus* populations affected by anthropogenic disturbance: present and future conservation implications. *Animal Conservation* 9: 29-37.
- Morán-López, R., Sánchez, J. M., Costillo, E., Corbacho, C. y Villegas, A. 2006b. Spatial variation in anthropic and natural factors regulating the breeding success of the cinereous vulture *Aegypius monachus* in the SW Iberian Peninsula. *Biological Conservation* 130: 169-182.
- Moreno, S. y Villafuerte R. 1994. Traditional management of scrubland for the conservation of rabbits *Oryctolagus cuniculus* and their predators in Doñana National Park, Spain. *Biological Conservation* 73: 81-85.
- Moreno, S., Villafuerte, R., Queirós, F., Jordán G. y Jiménez A. 1994. *Estudio de la incidencia de la enfermedad hemorrágica vírica en la población de conejos del Parque Nacional de Doñana*. Informe inédito. Estación Biológica de Doñana-CSIC. Sevilla.
- Moreno, S. 2002. *Recomendaciones para la mejora de las poblaciones de conejo silvestre*. Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. Mérida.
- Moreno, S., Villafuerte, R., Cabezas, S. y Lombardi L. 2004. Wild rabbit restocking for predator conservation in Spain. *Biological Conservation* 118: 183-193.
- Moreno-Opo, R., Guil, F., El Khadir, N., Oria, J., Soria, C. y Guzmán, J. 2004. *Conservación de buitre negro Aegypius monachus en fincas privadas*. Symposium Internacional sobre buitre negro. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Córdoba.
- Moreno-Opo, R., Guil, F. y El Khadir, N. 2005. Buitres negros y fincas de caza mayor. *Trofeo* 425: 86-90.
- Moreno-Opo, R., Guzmán, J., Arredondo, A. y Guil, F. 2007. Mortalidad de aves en tendidos eléctricos de la provincia de Ciudad Real. En: Casas, F., Arredondo, A. y López-Jamar, J. (eds.). *Anuario Ornitológico de Ciudad Real. 2004-2005*. SEO-Ciudad Real. Ciudad Real.
- Morillo, C. y Lalanda, J. 1972. *Primeros datos sobre la ecología de las Falconiformes en los Montes de Toledo*. *Boletín de la Estación Central de Ecología* 1 (2): 57-67.
- Morton, M. L., Wakamatsu, M. W., Pereyra, M. E. y Morton, G. A. 1991. Postfledging dispersal, habitat imprinting and philopatry in a montane, migratory sparrow. *Ornis Scandinavica* 22: 98-106.
- Mosqueda, I. 2004. El buitre negro *Aegypius monachus* en Castilla-La Mancha. En: *Resúmenes del Symposium Internacional sobre buitre negro*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.

Bibliografía

- Muñoz, J. 2005. *Fomento del conejo de monte (Oryctolagus cuniculus L.) en ecosistemas mediterráneos de suelos ácidos: ecología de madrigueras, selección y utilización de pastos y repoblaciones con conejos*. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid.
- Muñoz, J., García, F. M., Lara, J. y Shivik, J. A. 2007. Evaluación de nuevos métodos de captura selectiva de zorros. *Jara y sedal* 64: 72-82.
- Muslera, E. y Ratera, C. 1991. *Praderas y forrajes*. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
- Myers, K. y Poole W. E. 1961. A study of the biology of the wild rabbit, *Oryctolagus cuniculus* (L.), in confined populations. II. The effects of season and population increase on behaviour. *CSIRO Wildlife Research* 6: 1-41.
- Mykutowycz, R. 1958. Social behaviour of an experimental colony of wild rabbits, *Oryctolagus cuniculus* (L.). I. Establishment of the colony. *CSIRO Wildlife Research* 3: 7-25.
- 1961. Social behaviour of an experimental colony of wild rabbits, *Oryctolagus cuniculus* (L.). IV. Conclusion: outbreak of myxomatosis, third breeding season, and starvation. *CSIRO Wildlife Research* 6: 142-155.
- Mykutowycz, R. y Gamale S. 1965. A study of the inter-warren activities and dispersal of wild rabbits, *Oryctolagus cuniculus* (L.), living in a 45-ac paddock. *CSIRO Wildlife Research* 10: 111-123.
- Nagy, K. A. 1987. Field metabolic rates and food requirement scaling in mammals and birds. *Ecological Monographs* 57:111-128.
- 2005. Field metabolic rate and body size: a review. *The Journal of Experimental Biology* 208:1621-1625.
- Newsome, A. E., Parer, I. y Catling P. C. 1989. Prolonged prey suppression by carnivores-predator-removal experiments. *Oecologia* 78: 458-467.
- Newton, I. 1979. *Population ecology of raptors*. T & AD Poyser. London.
- 1986. *The Sparrowhawk*. T & AD Poyser Ltd. Berkhamsted.
- Newton, I. y Wyllie, I. 1992. Recovery of Sparrowhawk population in relation to declining pesticide contamination. *Journal of Applied Ecology* 29: 476-484.
- Nicholson, E. y Possingham, H. P. 2006. Objectives for multiple-species conservation planning. *Conservation Biology* 20 (3): 871-881.
- Noer, H. y Secher, H. 1990. Effects of legislative protection on survival rates and status improvements of birds of prey in Denmark. *Danish Rev. Game Biol.* 14: 1-63.
- Office International des Epizooties. 2006. *Lista de datos por enfermedad*. On line (http://www.oie.int/esp/maladies/es_alpha.htm).
- Olea, L. y San Miguel, A. 2006. The spanish dehesa. A traditional Mediterranean silvopastoral system linking production and nature conservation. En: Anónimo. *Sustainable Grassland Productivity*. 21st General Meeting of the European Grassland Federation. Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. Badajoz.
- Ontiveros, D. y Pleguezuelos J. M. 2000. Influence of prey densities in the distribution and breeding success of Bonelli's eagle (*Hieraetus fasciatus*): management implications. *Biological Conservation* 93: 19-25.
- Ordóñez, C. y Martínez-Alegría, R. 2003. *Sistemas de Información Geográfica. Aplicaciones prácticas con Idrisi32 al análisis de riesgos naturales y problemáticas medioambientales*. Ed. Ra-Ma. Madrid.
- Oria, J. 1999. Spanish imperial eagle *Aquila adalberti* attacks and kills a cinereous vulture *Aegypius monachus*. *Vulture News* 40: 37-39.
- Oria, J. y Martínez, C. 2006. *Vigilancia y seguimiento de buitres negro durante la nidificación en Valdemaqueda. Año 2006*. Informe inédito realizado por Boscaje S. L. para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid.
- Otero, C. 2005. *Modelos de gestión integrada para territorios mediterráneos con uso múltiple*. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid.
- Osácar, J. J., Lucientes, J., Gajón A., Moreno, C. y Calvete, C. 1996. Efficacy of burrows fumigations against wild rabbit (*Oryctolagus cuniculus* L.) fleas (Siphonaptera) in Ebro's middle valley (NE Spain). *10th European SOVE Meeting Strasbourg September 1996*.

- Osácar, J. J., Lucientes, J., Calvete, C., Peribáñez, M. A., Gracia, M. J. y Castillo, J. A. 2001. Seasonal abundance of fleas (Siphonaptera: Pulicidae, Ceratophyllidae) on wild rabbits in a semiarid area of northeastern Spain. *Journal of Medical Entomology* 38(3): 405-410.
- Pain, D. J., Burneleau, G., Bavoux, C. y Wyatt, C. 1999. Levels of polychlorinated biphenyls, organochlorine pesticides, mercury and lead in relation to shell thickness in Marsh Harrier (*Circus aeruginosus*) eggs from Charente-Maritime, France. *Environmental Pollution* 104: 61-68.
- Palma, L. 1985. The present situation of birds of prey in Portugal. *ICBP Technical Publications* 5: 3-14.
- Palma, L., Beja, P., Pais, M. y Cancela da Fonseca, L. 2006. Why do raptors take domestic prey? The case of Bonelli's eagles and pigeons. *Journal of Applied Ecology* 43(6): 1075-1086.
- Palomares, F., Gaona, P., Ferreras, P. y Delibes, M. 1995. Positive effects on game species of top predators by controlling smaller predators populations: an example with Lynx, Mongooses and rabbits. *Conservation Biology* 9(2): 295-305.
- Palomares, F., Ferreras, P., Fedriani, J. M. y Delibes, M. 1996. Spatial relationships between Iberian lynx and other carnivores in an area of south-western Spain. *Journal of Applied Ecology* 33: 5-13.
- Palomares, F., Calzada, J. y Delibes, M. 1997. Predation upon European rabbits and their use of open and closed patches in Mediterranean habitats. *Oikos* 80: 407-410.
- Palomares, F., Ferreras, P., Travaini, A. y Delibes, M. 1998. Co-existence between Iberian lynx and Egyptian mongooses: estimating interaction strength by structural equation modelling and testing by an observational study. *Journal of Applied Ecology* 67: 967-978.
- Palomares, F. 2001. Comparison of three methods to estimate rabbit abundance in a Mediterranean environment. *Wildlife Society Bulletin* 29 (2): 578-585.
- Palomares, F., Delibes, M., Revilla, E., Calzada, J. y Fedriani, J. M. 2001. Spatial ecology of the Iberian lynx and abundance of its primary prey, the European rabbit, in a heterogeneous environment. *Wildlife Monographs* 148: 1-36.
- Palomares, F. 2003. The negative impact of heavy rain on the abundance of Mediterranean population of European rabbits. *Mammalian Biology* 68: 224-234.
- Parer, I. 1977. The Population Ecology of the Wild Rabbit (*Oryctolagus cuniculus* [L]), in a Mediterranean-Type Climate in New South Wales. *Australian Wildlife Research* 4(2): 171-205.
- Parra, J. y Tellería, J. L. 2004. The increase of Spanish population of griffon vulture *Gyps fulvus* during 1989-1999: effects of food and nest site availability. *Bird Conservation International* 14: 33-41.
- Paton, D., Núñez, J., Fanlo, A., Alarcos, S., Latorre, E. y Díaz, M. 2004. Assessment of carrying capacity of *Cistus* spp. shrublands for red deer (*Cervus elaphus* L.) management in Monfragüe Natural Park (SW Spain). *Cahiers Options Méditerranéés* 62: 361-364.
- Pausas, J. G. 2004. La recurrencia de incendios en el monte mediterráneo. En: Vallejo, V. R. y Alloza, J. A. (eds.). Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. CEAM.
- Pearce, J. y Ferrier, S. 2000a. An evaluation of alternative algorithms for fitting species distribution models using logistic regression. *Ecological Modelling* 128: 127-147.
- 2000b. Evaluating the predictive performance of habitat models developed using logistic regression. *Ecological Modelling* 133: 225-245.
- Pech, R. P., Sinclair, A. R. E., Newsome, A. E. y Catling P. C. 1992. Limits to predator regulation of rabbits in Australia: evidence from predator-removal experiments. *Oecologia* 89(1): 102-112.
- Pennycuik, C. J. 1972. Soaring behaviour and performance of some East African birds, observed from a motorglider. *Ibis* 114: 178-218.
- 1978. Breeding of the lappet-faced and white-headed vultures (*Torgos tracheliotus* and *Trigonoceps occipitalis*) on the Serengeti plains, Tanzania. *East African Wildlife Journal* 14: 67-84.
- Pereira, J. M. C. e Itami, R. C. 1991. GIS-based habitat modelling using logistic multiple regression: a study of the Mt. Graham red squirrel. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing* 57:1475-1486.
- Perrins, C. M. y Birkhead, T. R. 1983. *Avian ecology*. Blackie. Glasgow.
- Person, D. K. y Hirth, D. H. 1991. Home range and habitat use of coyotes in a farm region of Vermont. *Journal of Wildlife Management* 55: 433-441.
- Piñol, J., Terradas, J. y Lloret, F. 1998. Climate warming, wildfire hazard, and wildfire occurrence in coastal eastern Spain. *Climate Change* 38 (3): 345-357.

- Piper, S. E. 2006. Supplementary feeding programmes: how necessary are they for the maintenance of numerous and healthy vulture populations? En: Houston, D. C. y Piper, S. E. (eds.). *Proceedings of the International Conference on Conservation and Management of Vulture Populations*. 14-16 November 2005, Thessaloniki, Greece. Natural History Museum of Crete & WWF Greece.
- Poole, W. E., Cowan, D. P. y Smith, G. C. 2003. Developing a census method based on sight counts to estimate (*Oryctolagus cuniculus*) numbers. *Wildlife Research* 30: 487-493.
- Porter, S. L. 1993. Pesticide poisoning in birds of prey. En: Redig, P. T., Cooper, J. E., Remple, J. D. y Hunter, D. B. (eds.). *Raptor Biomedicine*. Univ. Minnesota Press. Minneapolis.
- Posillico, M., Meriggi, A., Pagnin, E., Lovari, S., Russo, L. 2004. A habitat model for brown bear conservation and land use in the central Apennines. *Biological Conservation* 118:141-150.
- Poveda, J. B., Flossdorf, J., Meier, J., Kirchhoff, H. 1994. *Mycoplasma buteonis* sp. nov., *Mycoplasma falconis* sp. nov. and *Mycoplasma gypis* sp. nov. three species from birds of prey. *International Journal of Systematic Bacteriology* 44: 94-98.
- Powell, R. A. 2000. Animal home ranges and territories and home range estimators. En: L. Boitani y T. Fuller (eds.). *Research techniques in animal ecology: Controversies and Consequences*. Columbia University Press. New York.
- Pozairidis, K., Goutner, V., Skartsi, T. y Stamou, G. 2004. Modelling nesting habitat as a conservation tool for the Eurasian black vulture (*Aegyptius monachus*) in Dadia Nature Reserve, northeastern Greece. *Biological Conservation* 118: 235-248.
- Primack, R. B. 1995. *A primer of conservation biology*. Ed. Sinauer Associates Inc. Sunderland. Massachusetts.
- Prinzinger, R., Nagel, B., Bahat, O., Bögel, R., Karl, E., Weihs, D. y Walter, C. 2002. Energy metabolism and body temperature in the Griffon Vulture (*Gyps fulvus*) with comparative data on the Hooded Vulture (*Necrosyrtes monachus*) and the White-backed Vulture (*Gyps africanus*). *Journal of Ornithology* 143: 456-467.
- Quevedo, L., Rodrigo, A. y Espelta, J. M. 2005. Recuperación y capacidad de rebrote de especies poco abundantes en los Bosques Mediterráneos después de los incendios forestales. Comunicación tipo póster. Resúmenes de la *II Conferencia Internacional sobre estrategias de prevención de incendios en el Sur de Europa*. Barcelona.
- Rands, M. R. W. 1986. Effect of Hedgerow Characteristics on Partridge Breeding Densities. *Journal of Applied Ecology* 23 (2): 479-487.
- Ratcliffe, D. A. 1970. Changes attributable to pesticides in egg breakage frequency and eggshell thickness in some British birds. *Journal of Applied Ecology* 7: 67-115.
- Rau, J. R., Beltrán J. F. y Delibes M. 1985. Can the increase of fox density explain the decrease in lynx numbers in Doñana? *Revue Ecologie (Terre et Vie)* 40.
- Read, H. 2000. *Veteran trees. A guide to good management*. Ed. Peterborough.
- Real, J. y Mañosa, S. 2001. Dispersal of juvenile and immature Bonelli's Eagles in Northeastern Spain. *Journal of Raptor Research* 35: 9-14.
- Real, J. 2004. Águila Perdicera. En: Madroño, A., González, C. y Atienza, J. C. *Libro rojo de las aves de España*. SEO/BirdLife-Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- Recher, H. F. 1990. Specialist or generalist: Avian response to spatial y temporal changes in resources. *Studies in Avian Biology* 13: 333-336.
- Reddiex, B., Hickling, G. J., Norbury, G. L. y Frampton, C. M. 2002. Effects of predation and rabbit haemorrhagic disease on population dynamics of rabbits (*Oryctolagus cuniculus*) in North Canterbury, New Zealand. *Wildlife Research* 29(6): 627-633.
- Refoyo, P., Del Moral, J. C. y Martí, R. 1997. *Seguimiento de la colonia de Buitre Negro de Rascafría (Parque Natural de Peñalara)*. Informe inédito. SEO/BirdLife-Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid.
- Rendón, M. A., Garrido, A., Ramírez, J. M., Rendón-Martos, M. y Amat, J. A. 2001. Despotic establishment of breeding colonies of greater flamingos, *Phoenicopterus ruber*, in southern Spain. *Behavioural Ecology and Sociobiology* 50: 55-60.

- Revilla, E. y Palomares F. 2002. Does local feeding specialization exist in Eurasian badgers? *Canadian Journal of Zoology* 80: 83-93.
- Reynolds, J. C. y Tapper, S. C. 1995. The ecology of the red fox *Vulpes vulpes* in relation to small game in rural southern England. *Wildlife Biology* 1(2): 105-119.
- 1996. Control of mammalian predators in game management and conservation. *Mammal Review* 26(2): 127-156.
- Richardson, B. J., Hayes, R. A., Wheeler, S. H. y Yardin, M. R. 2002. Social structures, genetic structures and dispersal strategies in Australian rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) populations. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 51(2): 113-121.
- Ricketts, T. H. 2001. The matrix matters: Effective isolation in fragmented landscapes. *American Naturalist* 158: 87-99.
- Riseborough, R. 2004. Fatal medicine for vultures. *Nature* 427: 595-597.
- Rodríguez de Sancho, M. J. 2006. Incidencia ambiental de los incendios. *I.T.* 74: 60-67.
- Rojo, A. y Montero, G. 1996. *El pino silvestre en la Sierra de Guadarrama*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Rojo, A., Montero, G., Pérez-Antelo, A. 2001. Cuarenta años de ordenación del monte Cabeza de Hierro (Rascafría, Madrid): desarrollo de la ordenación y resultados conseguidos. Actas de la Tercera Reunión sobre Evolución de Ordenaciones Históricas. Almazán, 26-28 junio 2000. *Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales* 11: 23-24.
- Romanyk, N. y Cadahía, D. 1998. *Plagas de insectos en las masas forestales españolas*. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- Rosell, C. y Herrero, J. 2002. Jabalí *Sus scrofa*. En: L. J. Palomo y J. Gisbert (eds.). *Atlas de los Mamíferos terrestres de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. SECEM-SECEMU. Madrid.
- Rosemberg, D. K. y McKelvey, K. S. 1999. Estimation of habitat selection for central-place foraging animals. *Journal Wildlife Management* 63: 1028-1038.
- Roy, C., Grolleau, G., Chamounlaud, S. y Riviere, J. L. 2005. Plasma b-esterase activities in European birds. *Journal of Wildlife Disease* 41: 184-208.
- Ruiz, J. R., Gómez, R. y Gómez, M. V. 1988. *Las buítreras de Aroche. Un estudio biológico en la sierra de Huelva*. AMA-Junta de Andalucía. Sevilla.
- Ruiz de la Torre, J. 1979. *Árboles y arbustos de la España peninsular*. Fundación Conde del Valle del Salazar. Madrid.
- 2002. *Mapa Forestal de España (escala 1:100.000)*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- Ruiz-Mirazo, J., Robles, A. B., Ramos, M. E. y González, J. L. 2005. Las áreas cortafuegos como experiencia de selvicultura preventiva en los espacios forestales y agroforestales mediterráneos: 1. Diseño. En: Osoro, K., Argamentería, A. y Larraceleta, A. *Producciones agroganaderas: gestión eficiente y conservación del medio natural*. SERIDA. Gijón.
- Ruiz-Olmo, J., Blanch, F. y Vidal, F. 2003. Relationships between the Red Fox and Waterbirds in the Ebro Delta Natural Park, N.E. Spain. *Waterbirds* 26 (2): 217-225.
- Ruxton, G. D. y Houston, D. C. 2002. Modelling the energy budget of a colonial bird of prey, the Ruppell's griffon vulture, and consequences for its breeding ecology. *African Journal Ecology* 40: 260-266.
- San José, C. 2002. Corzo *Capreolus capreolus*. En: L. J. Palomo y J. Gisbert (eds.). *Atlas de los Mamíferos terrestres de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. SECEM-SECEMU. Madrid.
- San Miguel, A. 1994. *Dehesa española: origen, tipología, características y gestión*. Ed. Fundación Conde del Valle del Salazar. Madrid.
- 1995. *Ordenación de los pastizales naturales y artificiales de «Los Quintos de Mora» (Los Yébenes, Toledo) para la caza mayor*. Informe inédito. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid.
- San Miguel, A., Rodríguez-Vigal, C. y Sanz, V. 1996. Ordenación del monte mediterráneo para la caza mayor. *Ecosistemas* 16.

Bibliografía

- San Miguel, A. 2001. *Pastos naturales españoles*. Ed. Fundación Conde del Valle del Salazar-Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
- San Miguel, A. (coord.). 2006. *Manual de gestión del hábitat del lince ibérico (Lynx pardinus Temminck) y de su presa principal, el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus L.)*. Fundación CBD-Hábitat. Madrid.
- San Miguel, J. M., Álvarez, G. y Luzón, M. 2000. Procesos parasitarios detectados en ciervos abatidos en la provincia de Toledo. *Galemys* 12: 11-24.
- Sánchez, J. J. 1998. The recovery of the black vulture *Aegypius monachus* in Spain. En: Tewes, E., Sánchez, J. J., Heredia, B. y Bijleveld, M. *Proceedings of the international symposium on the black vulture in southern eastern Europe and adjacent regions. Dadia. Grecia*. BVCF-FZS. Mallorca.
- 2001. **Impacto del veneno sobre el buitre negro *Aegypius monachus*: colonias más afectadas**. En: Sánchez, J. J. y Roig, M. (eds.). *Ponencias del Congreso Internacional sobre el uso ilegal de veneno en el medio natural*. BVCF. Mallorca.
- 2003. **Buitre negro *Aegypius monachus***. En: Martí, R. y Del Moral, J. C. (eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 170-171. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SEO/BirdLife. Madrid.
- 2004a. **El programa Antídoto: una iniciativa contra el uso de cebos envenenados en el Medio Natural**. En: *Resúmenes del International Symposium on the Black vulture *Aegypius monachus**. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.
- 2004b. **Buitre negro *Aegypius monachus***. En: Madroño, A., González, C. y Atienza, J. C. *Libro rojo de las aves de España*. Ministerio de Medio Ambiente y SEO/BirdLife. Madrid.
- Santos, T. y Tellería, J. L. 1998. *Efectos de la fragmentación de los bosques sobre los vertebrados de la meseta ibérica*. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- 2006. **Pérdida y fragmentación del hábitat: efecto sobre la conservación de las especies**. *Ecosistemas* (2): 3-12 (<http://www.revistaecosistemas.net/pdfs/423.pdf>).
- Sarmiento, P. 1996. Feeding ecology of the European wildcat *Felis silvestris* in Portugal. *Acta Theriologica* 41 (4): 409-414.
- Sarrazin, F., Bagnolini, C., Pinna, J. L., Danchin, E. y Clobert, J. 1994. **High survival estimates of Griffon Vultures (*Gyps fulvus fulvus*) in a reintroduced population**. *The Auk* 111: 853-862.
- Saunders, G., McIlroy, J., Berghout, M., Kay, B., Gifford, E., Perry, R. y Van de Ven, R. 2002. The effects of induced sterility on the territorial behaviour and survival of foxes. *Journal of Applied Ecology* 39(1): 56-66.
- Schley, L. y Roper, T. J. 2003. Diet of wild boar *Sus scrofa* in Western Europe, with particular reference to consumption of agricultural crops. *Mammal review* 33 (1): 43-56.
- Segurado, P. y Araujo, M. B. 2004. An evaluation of methods for modelling species distributions. *Journal of Biogeography* 31:1555-1568.
- Seoane, J., Bustamante, J. y Díaz-Delgado, R. 2004. Competing roles for landscape, vegetation, topography and climate in predictive models of bird distribution. *Ecological Modelling* 171: 209-222.
- SEO/BirdLife. 1997. *Seguimiento de la colonia de Buitre negro de Rascafría (Parque Natural de Peñalara)*. Informe inédito. SEO/BirdLife-Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid.
- 2001. *Censo de la población reproductora de Buitre negro en la Comunidad de Madrid*. Informe inédito. TRAGSA. Madrid.
- 2003. *Gestión del hábitat del águila imperial*. SEO/BirdLife. Madrid.
- 2006. *Voluntarios de SEO/BirdLife localizan 200 aves muertas en distintas líneas eléctricas del país*. Nota de prensa. (http://www.seo.org/sala_detalle.cfm?idSala=1505&CFID=827177&CFTOKEN=42030746&jsessionid=aa307372de127694a212).
- SEO-Salamanca. 2005. Nueva amenaza para la sierra de las Quilamas. *La Garcilla* 125: 47.
- Serrada, R. 2000. *Apuntes de repoblaciones forestales*. Fundación Conde del Valle de Salazar. Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Forestales. Madrid.
- Serrada, 2005. *Apuntes de Selvicultura*. Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Forestales. Madrid.

- Shivik, J. A., Treves, A. y Callahan, P. 2003. Nonlethal Techniques for Managing Predation: Primary and Secondary Repellents. *Conservation Biology* 17 (6): 1531-1537.
- Shivik, J. A., Martin, D. J., Pipas, M. J., Turnan, J. y DeLiberto, T. J. 2005. Initial comparison: jaws, cables, and cage-traps to capture coyotes. *Wildlife Society Bulletin* 33 (4): 1375-1383.
- Siegel, N. J., Shipley, N. A. y Saylor, R. D. 2004. Effects of cattle grazing on ecology and habitat of Columbia Basin pygmy rabbits (*Brachylagus idahoensis*). *Biological Conservation* 119: 525-534.
- Simón, M. A., Yanes, M., Valero, A., Gutiérrez, J. E., Carrasco, A., Molino, F. y Saenz, E. 2004. Estrategia para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en Andalucía: plan de acción. En: *Resúmenes del International Symposium on the Black vulture Aegypius monachus*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.
- Simpson, V. R., Bain, M. S., Brown, R., Brown, B. F., Lacey, R. F. 2000. A long-term study of vitamin A and polychlorinated hydrocarbon levels in otters (*Lutra lutra*) in south west England. *Environmental Pollution* 110: 267-75.
- Sinclair, A. R. E., Pech, R. P., Dickman, C. R., Hik, D., Mahon, P. y Newsome, A. E. 1998. Predicting Effects of Predation on Conservation of Endangered Prey. *Conservation Biology* 12 (3): 564-575.
- Smith, A. T. y Peacock, M. M. 1990. Conspicuous attraction and the determination of metapopulation colonization rates. *Conservation Biology* 4: 320-323.
- Smith, G. C., Pugh, B. y Trout, R. C. 1995. Age and sex bias in samples of wild rabbits, *Oryctolagus cuniculus*, from wild populations in southern England. *New Zealand Journal of Zoology* 22(2): 115-121.
- Snyder, N y Zinder, H. 2000. *The California Condor: A saga of Natural History and Conservation*. Academic Press. San Diego.
- Soriguer, R. C. 1977. Mixomatosis en una población de conejos de Andalucía Occidental. Evolución temporal, epidemia invernal y resistencia genética. 241-250. *I Reunión Iberoamericana de Zoología Vertebrados*.
- 1980. Ciclo anual de parasitismo por pulgas y garrapatas en el conejo de campo (*Oryctolagus cuniculus* L) en Andalucía Occidental, España. *Revista Ibérica de Parasitología* 40(4): 539-550.
- 1981. Biología y dinámica de una población de conejos (*Oryctolagus cuniculus* L.) en Andalucía Occidental. *Doñana Acta Vertebrata* 8 (3):1-378.
- Soriguer, R. C., Rogers C. M. 1981. The European wild rabbit in Mediterranean Spain. *Proceedings of the World Lagomorph Conference*.
- Soriguer, R. C. 1988. Alimentación del conejo (*Oryctolagus cuniculus* L.) en Doñana, S.O. España. *Doñana Acta Vertebrata* 15(1): 141-150.
- Soriguer, R. C., Fandós, P., Bernáldez, E. y Delibes, J. R. 1994. *El ciervo en Andalucía*. Junta de Andalucía. Sevilla.
- Soto-Largo, E. 1996. Efectos de la actividad humana sobre los territorios de nidificación del águila imperial ibérica (*Aquila adalberti*) en la Comunidad de Madrid. En: Muntaner, J. y Mayol, J. (eds.). *Biología y Conservación de las Rapaces Mediterráneas*. Monografías, n° 4. SEO/BirdLife. Madrid.
- 1998. *Censo de la población reproductora de buitre negro en la provincia de Ávila*. Informe inédito. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila. Junta de Castilla y León.
- Soto-Largo, E. y Oría, J. 2000. *I Censo de buitre negro Aegypius monachus en Castilla y León, año 2000*. Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León.
- Soto-Largo, E. 2003. *Censo, seguimiento de la población reproductora del buitre negro en la provincia de Ávila*. Informe inédito. OIKOS Conservación y Gestión de la Biodiversidad y el Territorio. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila. Junta de Castilla y León.
- Soto-Largo, E. y Cano, L. S. 2005. *Censo, seguimiento de la población reproductora del buitre negro en la provincia de Ávila. Año 2005*. Informe inédito. OIKOS Conservación y Gestión de la Biodiversidad y el Territorio. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila. Junta de Castilla y León.

- Soto-Largo, E. y García, J. M. 2006. *Censo, seguimiento de la población reproductora del buitre negro en la provincia de Ávila. Año 2006*. Informe inédito. OIKOS Conservación y Gestión de la Biodiversidad y el Territorio. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila. Junta de Castilla y León.
- Steidl, R. J. y Anthony, R. G. 2000. Experimental effects of human activity on breeding bald eagles. *Ecological Applications* 10 (1): 258-268.
- Stephens, D. W. y Krebs, J. R. 1986. *Foraging theory*. Princeton University Press. Princeton.
- Stoate, C. 2002. Multifunctional use of a natural resource on farmland: wild pheasant (*Phasianus colchicus*) management and the conservation of farmland passerines. *Biodiversity and Conservation* 11 (4): 561-573.
- Suetens, V. y Van Groenendael, P. 1996. Sobre ecología y conducta reproductora del buitre negro *Aegypius monachus*. *Ardeola* 12 (1): 19-44.
- Summers, R. W., Green, R. E., Proctor, R., Dugan, D., Lambie, D., Moncrieff, R., Moss, R. y Baines, D. 2004. An experimental study of the effects of predation on the breeding productivity of capercaillie and black grouse. *Journal of Applied Ecology* 41(3): 513-525.
- Sunyer, C. 1990. El periodo de emancipación en el Quebrantahuesos: consideraciones sobre su conservación. En: R. Heredia and B. Heredia (eds.). *El Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en Los Pirineos. Características ecológicas y Biología de la Conservación*. ICONA. Madrid.
- Tapper, S. C., Potts G. R. y Brockless M. H. 1996. The Effect of an Experimental Reduction in Predation Pressure on the Breeding Success and Population Density of Grey Partridges *Perdix perdix*. *Journal of Applied Ecology* 33(5): 965-978.
- Taylor, R. H. y Williams R. M. 1956. The use of pellet counts for estimating the density of populations of the wild rabbit, *Oryctolagus cuniculus* (L.). *New Zealand Journal of Science and Technology* 38(B): 236-256.
- Terrasse, M., Sarrazin, F., Choisy, J. P., Clémente, C., Henriquet, S., Lécuyer, P., Pinna, J. L. y Tessier, C. 2004. A success store: the reintroduction of eurasian griffon *Gyps fulvus* and black *Aegypius monachus* vultures to France. En: Chancellor, R. D. y Meyburg, B. U. *Raptors Worldwide*. WWGBP/MME.
- Tewes, E. 1996. *The European Black Vulture Aegypius monachus, management techniques and habitat requirements*. Tesis Doctoral. Universidad de Viena.
- 2004a. Situación del buitre negro *Aegypius monachus* en Mallorca. *Anuari Ornitológic de les Balears* 19: 99-108.
- 2004b. Avances en la estrategia para la recuperación del buitre negro *Aegypius monachus* en Europa. En: *Resúmenes del Symposium Internacional sobre buitre negro*. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Córdoba.
- Tewes, E., Sánchez, J. J. y Ramírez, P. 2004. Status and Conservation of the european black vulture *Aegypius monachus* in Europe. En: Charcellor, R. D. y Meyburg, B. U. *Raptors Worldwide*. WWGBP/MME.
- Thompson, J. y Fleming P. J. S. 1994. Evaluation of the efficacy of 1080 poisoning of red foxes using visitation to non-toxic baits as an index of fox abundance. *Wildlife Research* 21(1): 27-39.
- Torres-Esquivias, J. A., Jordano, P., Villasante, J. 1980. Estructura y dinámica temporal de una colonia de Buitre Negro, *Aegypius monachus*, en Sierra Morena Central (Córdoba). *Boletín de la Estación Central de Ecología* 9 (17): 67-72.
- Torres-Esquivias, J. A. y Arenas, R. 1996. Evolución poblacional de las grandes rapaces diurnas en el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos (Córdoba, España). En: Muntaner, J. y Mayol, J. (eds.). *Biología y conservación de las rapaces mediterráneas*, pp: 305-310. SEO/BirdLife. Madrid.
- TRAGSA, 2003. *Caracterización de las líneas eléctricas en Toledo y su incidencia en la avifauna*. Informe inédito.
- Traverso, J. M. 2001. Nidificaciones sobre árbol de buitre leonado en España. *Quercus* 180: 23-25.
- Tucker, G. M. y Heath, M. F. (eds.). 1994. *Birds in Europe. Their conservation status*. BirdLife Conservation Series N° 3. BirdLife International. Cambridge.

- Vallejo, V. R. y Alloza, J. A. 1998. The restoration of burned lands: the case of Eastern Spain. En: Moreno, J. M. (ed.). *Large Forest Fires*. Backhuy Publishers. Leiden.
- Valverde, J. A. 1966. Sobre buitres negros en Andalucía. *Ardeola* 12: 101-115.
- Varillas, B. 2004. Estrategia Nacional contra el uso de cebos envenenados en el medio natural. En: *Resúmenes del Simposium Internacional sobre el Buitre Negro*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.
- Vasilakis, D., Poirazidis, K. y Elorriaga, J. 2006. Range use of an Eurasian black vulture *Aegypius monachus* population in Dadia National Park and the adjacent areas, Thrace, NE Greece. *10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions*. Hellenic Zoological Society. Thessaloniki.
- Velez, R. 2000. *La defensa contra incendios forestales. Fundamentos y experiencias*. McGraw-Hill. Madrid.
- Viada, C. (ed.). 1998. *Áreas importantes para las aves en España*. Monografía nº 5. SEO/BirdLife. Madrid.
- Vieira, J. 1991. *Subericultura*. Secretaría General Técnica. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- Vielva, J. 2004. Seguimiento del Buitre Negro en la Comunidad de Madrid. En: *Resúmenes del Simposium Internacional sobre el Buitre Negro*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.
- Villafuerte, R., Calvete, C., Blanco, J. C. y Lucientes, J. 1995. Incidence of viral haemorrhagic disease in wild rabbit populations in Spain. *Mammalia* 59: 651-659.
- Villafuerte, R., Lazo A. y Moreno S. 1997. Influence of food abundance and quality on rabbit fluctuations: conservation and management implications in Doñana National Park (SW Spain). *Revue Ecologie (Terre et Vie)* 52: 345-358.
- Villafuerte, R. y Moreno S. 1997. Predation risk, cover type and group size in European rabbits in Doñana (SW Spain). *Acta Theriologica* 42 (2): 225-230.
- Villafuerte, R., Viñuela J. y Blanco J. C. 1998. Extensive predator persecution caused by population crash in a game species: the case of Red kites and Rabbits in Spain. *Biological Conservation* 84: 181-188.
- Villafuerte, R. y Viñuela J. 1999. Size of rabbits consumed by black kites increased after a rabbit epizootic. *Mammal Review* 29(4): 261-264.
- Villafuerte, R., Calvete, C., Angulo, E., Moreno, S., de la Puente, A. y Branco M. S. 2001. *Análisis de la efectividad de las repoblaciones de conejo y otras medidas de gestión en el Parque Nacional de Doñana*. Informe inédito. IREC-CSIC-UCLM-JCCM.
- Villafuerte, R. 2002. Conejo *Oryctolagus cuniculus*. En: Palomo, L. J. y Gisbert, J. (eds.). Atlas de los mamíferos terrestres de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM.
- Villanúa, D., Höfle, U., Pérez, L. y Gortázar, C. *En prensa*. *Trichomonas gallinae* in wintering common wood pigeons *Columba palumbus* in Spain. *Ibis*.
- Villegas, A., Sánchez, J. M., Costillo, E. y Corbacho, C. 2002. Blood chemistry and hematocrit of the black vulture (*Aegypius monachus*). *Comparative Biochemistry and Physiology* 132 A: 489-497.
- Viñuela, J. y Veiga, J. P. 1992. Importance of rabbits in the diet and reproductive success of Black Kites *Milvus milvus* in southwestern Spain. *Ornis Scandinavica* 23: 132-138.
- Virgós, E., Cabezas, S. y Lozano, J. 2005. El declive del conejo en España. *Quercus* 236: 16-20.
- Virgós, E. y Travaini A. 2005a. Relationship Between Small-game Hunting and Carnivore Diversity in Central Spain. *Biodiversity and Conservation* 14: 3475-3486.
- Vitale, A. F. 1989. Pattern of dispersion of young wild rabbits, *Oryctolagus cuniculus* L., in relation to burrows. *Ethology* 83 (4): 306-315
- Walls, S. S. y Kenward, R. E. 1995. Movements of radio-tagged Common Buzzards *Buteo buteo* in their first year. *Ibis* 137: 177-182.
- 1998. Movements of radio-tagged Buzzards *Buteo buteo* in early life. *Ibis* 140: 561-568.
- Walls, S. S., Mañosa, S., Fuller, R. M., Hodder, K. H. y Kenward, R. E. 1999. Is early dispersal enterprise or exile? Evidence from radio-tagged buzzards. *Journal of Avian Biology* 30: 407-415.

Bibliografía

- Wasser, J. S. 1986. The relationship of energetics of Falconiform birds to body mass and climate. *The Condor* 88: 57-62.
- Weatherhead, P. J. y Forbes, M. R. L. 1994. Natal philopatry in passerine birds: Genetic or ecological influences? *Behavioral Ecology* 5: 426-433.
- Webb, N. J. 1993. Growth mortality in European wild rabbit (*Oryctolagus cuniculus*). *Journal of Zoology* 230: 665-677.
- Wiemeyer, S. N., Lamont, T. G., Bunck, C. M., Sindelar, C. R., Gramlich, F. J., Fraser J. D., and M.A. Byrd. 1984. Organochlorine pesticide, polychlorobiphenyl, and mercury residues in bald eagle eggs —1969-79— and their relationships to shell thinning and reproduction. *Arch. Environ. Contam. Toxicol.* 13: 529-549.
- Wobser, G., Bollinger, T., Leighton, F. A., Blakley, B. y Mineau, P. 2004. Secondary poisoning of eagles following intentional poisoning of coyote with anticholinesterase pesticides in western Canada. *Journal of Wildlife Disease* 40: 163-172.
- Wunderle, J. M. 1991. Age-specific foraging proficiency in birds. *Current Ornithology* 8: 273-324.
- WWF/Adena. 2001. *Gestión de fincas linceras*. WWF/Adena. Madrid.
- 2006a. *Grandes incendios forestales*. WWF/Adena. Madrid.
- 2006b. *Financiación de Red Natura 2000. Manual de orientación*. Comisión Europea-D.G. Medio Ambiente.
- WWF. 2006c. *Cork screwed? Environmental and economic impacts of the cork stoppers market*. Informe inédito (http://www.wwf.es/alcornocales/descargas/Cork_REV12_web.pdf).
- XiaoTi, Y. 1991. Distribution and status of cinereous vulture *Aegypius monachus* in China. *Birds of Prey Bulletin* 4: 51-56.
- Yamac, E., Can Bilgin, C. y Yavuz, A. 2006. Nest and nest tree characteristics of cinereous vulture *Aegypius monachus* in the Turkmenbaba Mountain, northwest Turkey. In: Houston, D. C. y Piper, S. E. (eds.). *Proceedings of the International Conference on Conservation and Management of Vulture Populations*. 14-16 November. Thessaloniki.
- Zamora, M., Peinado, E., Sánchez, M., Gallego, B. y Mata, C. 1985. Consumo de bellotas por conejos en pastoreo continuo. *Archivos de Zootecnia* 34: 257-264.
- Zar, F. 1968. Standard metabolism comparison between Orders of birds. *Condor* 70: 278.